

ZOOHYLACIUM
GRONOVIANUM,

exhibens

ANIMALIA

QUADRUPEDA, AMPHIBIA,

PISCES, INSECTA, VERMES,

MOLLUSCA, TESTACEA,

ET ZOOPHYTA,

Quae in Museo suo adfervavit, examini
subjecit, systematice disposuit
atque descripsit

LAUR. THEOD. GRONOVIVS, J. U. D.

CIVITATIS LUGDUNO BATAVÆ SENATOR, SOCIETATIS PHYSICO-
MEDICAE REGIAE LONDINENSIS, BASILÆENSIS,
ATQUE HOLLANDICÆ SOCIUS.

Additis rarissimorum objectorum iconismis.



LUGDUNI BATAVORUM,

APUD


THEODORUM HAAK ET SOCIUM

ET

SAMUELEM ET JOHANNEM LUCHTMANS:

MDCCLXXKI.

1781 = 1763
Lugdun. h. h. ?



Z O O P H Y L A C I U M G R O N O V I A N U M.



Q U A D R U P E D I A.

* * * * *

E D E N T U L A.

MYRMECOPHAGA. Ediffon. Quadr. gen. 1.

1. MYRMECOPHAGA rostro brevi, pedibus anticis didactylis, posticis tetradactylis. *Briffon. Regn. Anim. n. 4.*

Myrmecophaga manibus didactylis, plantis tetradactylis. *Linu. Mus. Regis Sueciae. p. 8: Syst. Nat. Ed. 10. gen. 3. n. 1.*

The little Ant-eater. *Fides. Glean. p. 20. tab. 220.*

Tamandua fere Comy Americana alba. *Seb. Thes. vol. 1. p. 65. n. 3. tab. 37. fig. 3. cetera, eandem dignis modo unicis in pedibus anticis repraesententur. Belgis Misen-ceter.*

Caput crassum antice peracatum. Oculi parvi, oblique positi. *Rostrum* elongatum, tenue, subulatum. *Os* angustissimum, edentulum. *Nares* in antice rostro sitae. *Maxillae* aequales. *Aures* breves, subrotundae, in lateribus capitis mox post oculos sitae.

Truncus brevis, crassus. *Cauda* elongata, corporis longitudinem adaequans, crassi, conica, apice crasso, subtus nudo instructa: caeterum undique laxa, brevis (eodem modo quo corpus,) obtecta.

Pedes breves, quorum *Anteriores* unguibus duo-

bus absque digitis instructi, & *Posteriores* quatuor aequalibus unguibus etiam absque digitis armati sunt. *Ungues* maximi, validissimi, subulati, arcuati, ventis volam flexiles. *Manuum, Plantaeque* pedum nudae, callosae, planae.

Pilis seu potius *Lani* tenuissima, brevis, crispae, corpus undique, caput, pedes, facies & cauda, excepta ejus apicis parte inferiore, quae nuda est, conteguntur.

Habitat in America Meridionali.

Longitudo ab apice rostri usque ad extremam caudam — — — — — 1 — 10 — :

2. MYRMECOPHAGA rostro longissimo, pedibus anticis tetradactylis, posticis pentadactylis: cauda fere nuda. *Briffon. Regn. Anim. n. 2.*

Myrmecophaga palmis tetradactylis, plantis pentadactylis. *Linu. Syst. Nat. Ed. 10. gen. 2. n. 3.*

Tamandua Brasiliensibus. *Marsgr. Brasil. p. 225. tab. p. 226.*

Caput angustum, longissimum, oblongo-conicum. *Narium foramina* lunata, in apice rostri. *Maxillae* aequales, rotundae, edentulae. *Lingua* teres, cylindrica, vermiformis, fibra. *Oculi* parvi, in capitis lateribus, auribus paulo propiores quam apici rostri. *Auriculae* crassae, rotundatae, parvae. *Collum* crassiusculum.

Pedes anticis tetradactyli, & *postici* pentadactyli. *Digiti* sili. *Ungues* breviores quam in praecedente specie.

Cauda longitudinem corporis fere adaequans, inferne carinata, nudiuscula, intorta, cujus ope de arboribus pendet.

Inhabitat Americam Meridionalem.

* * * * *

*INCISORIBUS DENTIBUS UTRINQUE: CANINIS NULLIS,
PEDIBUSQUE TRIUNGULATIS.*

RHINOCEROS. *Briffon. Quadr. gen. 16.*

13. RHINOCEROS cornu unico conico. *Linn. Syst. Nat. Edit. 10. gen. 22. n. 1.*

Rhinoceros. Briffon. Regn. Anim. n. 1: Puffon. Philos. Transact. vol. 42. n. 470. p. 523.

Hujus animalis cornu tantum affervo.

* * * * *

*INCISORIBUS DENTIBUS UTRINQUE; CANINIS NULLIS,
ET DIGITIS UNGUICULATIS.*

CUNICULUS. *Briffon. Quadr. gen. 23.*

14. CUNICULUS caudatus, auritus, pilis ex rufo & fulco mixtis, rigidis vestitus. *Briffon. Regn. Anim. n. 2.*

Aguti vel Acuti Brasiliensibus. Maregr. Brasil. lib. 6. cap. 4. p. 224.

15. CUNICULUS caudatus, auritus, pilis obscure fulvis, rigidis, lineis ex albo flavescens ad latera distinctis. *Briffon. Regn. Anim. n. 4.*

Paca Brasiliensibus. Maregr. Brasil. lib. 6. cap. 3. p. 224.

Egregie, quemadmodum & superior, describitur a Briffonio, l. c. Habitant ambae species in America Meridionali.

16. CUNICULUS ecaudatus, auritus, albus aut rufus aut ex utroque variegatus. *Briffon. Regn. Anim. n. 7.*

*Mus cauda nulla, palmis tetradactylis, plantis tridactylis. Linn. Syst. Nat. Ed. 10. gen. 26. n. 1.
Mus Porcellus. Linn. Amoen. Acad. vol. 4. p. 190. tab. 2.*

Optime hanc speciem descripsit D. Naumannus in Dissertatione Amoenitatibus Academicis Cl. Linnaei inserta.

SCIURUS. *Briffon. Quadr. gen. 24.*

17. SCIURUS auriculis apice barbatis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis. *Linn. Syst. Nat. Ed. 10. gen. 27. n. 1.*

Sciurus palmis folis saliens. Linn. Faun. Suec. 1. §. 21: Kramer. Floench. p. 314.

Sciurus rufus, quandoque griseo admixto. Briffon. Regn. Anim. n. 1.

Sciurus. Blaf. Anat. Anim. tab. 35.

Habitat ubique in Europaeis Sylvis.

M U S. *Briffon. Quadr. gen. 26.*

18. MUS cauda longissima, obscure cinereus. *Briffon. Regn. Anim. n. 1.*

Mus cauda longa subnuda, corpore fusco-cinerecente. Linn. Faun. Suec. 1. §. 28.

Mus cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis cum unguiculo pollicari, plantis pentadactylis. Linn. Syst. Nat. Ed. 10. gen. 26. n. 9.

Cauda toto corpore longior, vis hirsuta. Habitat in domibus.

19. MUS cauda longissima, obscure cinereus, ventre albescens. *Briffon. Regn. Anim. n. 2.*

Mus cauda longa nudiuscula; corpore cinereo-fusco; abdomine sabalbescens. Linn. Faun. Suec. 1. §. 31: Mus. Regis Sueciae p. 9.

Mus cauda elongata subnuda; palmis tetradactylis, plantis pentadactylis. Linn. Syst. Nat. Ed. 10. gen. 26. n. 10.

Cauda corpore multo brevior, subnuda.

INCA-