

CAROLI A LINNÉ,

*Equitis aurati de fletu polari,*

ARCHIATRI REGII, MED. ET BOTAN. PROFESS. UPSAL. ACAD. PARIS.

UPSAL. MOLM. PETROPOL. BEROLIN. IMPER. LONDIN. ANGL.

MONSP. TOLOS. FLORENT. EDINS. BERN. SOC.

SYSTEMA  
NATURAE

PER

REGNA TRIA NATURAE,

SECUNDUM

CLASSES, ORDINES,  
GENERA, SPECIES,

CUM

CHARACTERIBUS, DIFFERENTIIS, SYNONYMIS,  
LOCIS.

TOMUS I.

EDITIO DECIMA TERTIA, AUCTA, REFORMATA.

CURA

JO. FRID. GMELIN,

PHILOS. ET MED. DOCTOR. HUIUS ET CHEM. IN GEORGIA AUGUSTI, PROF.  
P. O. ACAD. CAESAR. NATURAE CURIOSORUM ET ELECTORAL. MOGUNTIN.  
EMFORDENSIS, NEC NOM SOCIET. REG. SCIENT. GOETTINGENSIS,  
PHYSICAE TIGURIN., ET METALLICAE MAMBI.

LIPSIAE, 1788.

IMPENSIS GEORG. EMANUEL. BEER.

36. RHINOCEROS. Cornu solidum perenne conicum, naso insidens, cum osse non cohaerens.

unicor-  
nis.

1. R. cornu unico. Gesn. quadr. p. 842. Albin. tab. miscul. 4. 8. Knorr delic. T. II. p. 110. t. K. X. Parsons pbi- lasoph. Transact. Vol. XLII. n. 523. Edw. av. t. 221. f. 2.

Habitat inter et prope tropicos in paludosis, jam Jobo memoratus, sub nomine RHEM; in pugnis animalium apud Romanos celebratis vulgaris, per longum tamen temporis spatium in Europa invisus, donec seculo decimo sexto aliqui ejus exempla in Europam devenerint: Vitisis repretibus, spinis, in coeuo se volutans, parumper mansuescens, mitis, nisi laeessatur, irritatus cum fragore arbores prostermit; retro mingit et coit; unum modo pulsum parit. Visus debilis, olfactus et auditus sauro praeflantior.

Statura et magnitudine, pedibus brevioribus exceptis, non tamen sagacitate et docilitate ad elephantem, reliqua forma, moribus, voce grunniense propius ad suam praesertim aethiopicum accedit. Cutis dura, ut sagittas, globuli sclopetarii, gladii illius inde resilians, nuda pilis, nisi cauda et auriculis: Suturae s. rugae transversules a) capitis postica. b) scapularis. c) abdominalis ante femora. d) femoralis trans femora. Caro crassa, spongiosa, vix edulis. Lingua mollis. Cornu basi crinitum, acutum, fibrosum, 3 aliquando pedum longitudinem attingens. Dentes primores adulto nulli, juniari remotissimi solitarii occurrentes. Ungulae tres. Cauda attenuata, pedibus brevior.

dicornis. 2. R. cornubus duobus. Syst. nat. Ed. X. p. 56. n. 2. Sparrmann alt. Hohn. 1778. trin. 4. n. 5.

Habitat in Africa, ossibus ejus, teste imperius Pallas, frequentissime in Russia, boreali quoque sepulsis; jam Pausanias et Martialis dictus, in numis Domitiani obvius, a Cosimo sexto seculo memoratus, vix differta videtur specie, neque tamen modo sexu aut aetate.

Caro ad fucillam, viscera ad equina accedunt. Cystis fellea nulla. Dentes primores nulli. Cornu alterum supra primum versus frontem.

Rarior est rhinoceros tricornis, tertio tunc cornu ex altero utro priorum excrescente.