

GUILIELMI HENRICI KRAMER

SAXONIS DRESDENSIS,
PHILOSOPHIAE ET MEDICINAE DOCTORIS

ELENCHVS
VEGETABILIVM

ET

ANIMALIVM

PER

AVSTRIAM INFERIOREM
OBSERVATORVM.

SISTENS EA IN

CLASSES ET ORDINES

GENERA ET SPECIES

REDACTA.



VIENNÆ, PRAGÆ, ET TERGESTI,
Typis IOANNIS THOME TRATTNER, Cæf. Reg.
Aulæ Typographi & Bibliopole, MDCCLVI.

53

6. *Mus cauda pilosa elongata, corpore rufo, gula albicante.* *Linn. Syst. natur. 10. Fn. Succ. 32.*
Mus avellanarum minor. *Raj. quadr. 220.*
 Austr. 10the Waldmauß.
Habitat in sylvis, præsertim in sylva Dornbacensi frequens.
Vicitat glandibus.
7. *Mus cauda elongata, corpore cinereo rutilo nigroque longitudinaliter vario.* *Linn. Syst. natur. 10.*
Cricetus. *Raj. quadr. 221.*
 Austr. Frieisch, Hamster.
Habitat in campis, & in marginibus agrorum passim.
Vicitat granis fructibus, gramine.
8. *Mus cauda elongata nuda, corpore rufo.* *Linn. Syst. natur. 10.*
Mus alpinus. *Raj. quadr. 221.*
 Austr. Mummelhiert.
Hospitatur sabinde Viennæ ex Carniola, Carinthia, & Tirole allatus.
Vicitat oleraceis, fructibus.

S O R E X.

- I. *Sorex.* *Linn. Syst. natur. 10. Fn. Succ. 33.*
Mus araneus. *Gesn. quadr. 747. Aldr. quadr. 441. Jonst. quadr. 1. 66. Raj. quadr. 239.*
 Austr. Spitzmauß.
Habitat in sylvis, & cavernis passim, præsertim in valle Breinina.
Vicitat - - - -

J V M E N T A.

R H I N O C E R O S.

- I. *Rhinoceros cornu unico conico.* *Linn. Syst. natur. 11.*
 Austr. Rhinoceros.
Hospitabatur 1750. & 1751. a batavo allatus Viennæ.
Vicitabat feno, pane.

E Q V V S.

- I. *Equus cauda undique setosa.* *Linn. Syst. natur. 11. Fn. Succ. 34.*
Equus, Caballus, Equa. *Gesn. quadr. 132.*
Equus, Aldr. quadr. 12. Raj. quadr. 62.
 Austr. Pferd.
Habitat ubique in Civitatibus, oppidis, & pagis.

REGNUM ANIMALIUM
IN CLASSES IX DISTRIBUTUM
SIVE
SYNOPSIS METHODICA

SISTENS GENERALEM ANIMALIUM
distributionem in Classes IX, & duarum primarum
Classium, *Quadrupedum* scilicet & *Cetaceorum*, par-
ticularem divisionem in Ordines, Sectiones, Genera
& Species.

CUM BREVI CUJUSQUE SPECIE
descriptione, Citationibus Auctorum de iis tractantium
Nominibus eis ab ipsis & Nationibus impositis, Nominibus
que vulgaribus.

A. D. BRISSON, Historiæ Naturalis Musei Realemurini
Demonstratore.

Cum Figuris æneis.



P A R I S I I S,

AD RIPAM AUGUSTINORUM.

Apud CL. JOANNEM-BAPTISTAM BAUCHE, Bibliopolam
Insigne Sæ. Genovefæ, & Sii. Joannis in Deserto.

M. DCC. LVI.

Cum Privilegio Regis & Approbatione.



ORDO VIII.

QUADRUPEDA

Dentibus incisivibus in utraque maxillâ, & tribus digitis unguulatis in singulis pedibus donata.

RHINOCEROS solus hunc Ordinem constituit.

XVI.

Genus Rhinocerotis:

Hujus character est
Dentes incisores in utraque maxillâ duo, à se invicem plurimum remoti:
In singulis pedibus digiti tres unguulati:
Cornu in naso.

Obs. Uniuscujusque maxillæ pars anterior aliquo modo plana est, vel potius quasi quadratim truncata; & unusquisque dens incisivus in angulis, partibus maxillarum anterioribus & lateralibus constitutis, situs est. Dentes caninos non habet; sed 12 sunt molares in utraque maxillâ, 6 utrinque.

ORDRE VIII.

LES QUADRUPÈDES

Qui ont des dents incisives à deux mâchoires, & trois doigts ongulés à chaque pied.

IL n'y a dans cet Ordre qu'un seul QUADRUPÈDE, qui est le *Rhinoceros*.

XVI.

Le Genre du Rhinoceros:

Son caractère est
D'avoir à chaque mâchoire deux dents incisives, très éloignées l'une de l'autre:
Trois doigts ongulés à chaque pied:
Une corne sur le nez.

Obs. La partie antérieure de chaque de ses mâchoires est en quelque façon aplatie, ou plutôt comme coupée quarrément, & chacune des dents incisives est placée à peu-près dans des angles formés par le devant des mâchoires & leurs côtés. Il n'a point de dents canines; mais il a à chaque mâchoire 12 dents molaires, 6 à chaque côté.

** I. LE RHINOCEROS.

RHINOCEROS.

Rhinoceros cornu unico conico. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 25. sp. 4.*

Rhinoceros. *Raj. Syn. Quadr. p. 122.*

Klein. Quadr. p. 26.

Gesn. Quadr. p. 952. Fig. p. 953. (Fig. mala).

Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 60. [Fig. mala].

Aldro. Quadr. Bis. p. 878. Fig. p. 884. [Fig. mala].

Jonst. Quadr. p. 66. Fig. T. 38. (Fig. mala).

Mus. Worm. p. 336.

Charlet. Exer. p. 12.

Abada, sive Rhinoceros. *Bont. Ind. Ori. p. 50. Fig. p. 51. [Fig. sat be digiti ungulati essent].*

Naricornis Catelani. *Klein.*

Rhinoceros. *Kolbe. Tom. III. p. 13. Fig. p. 14. (Fig. mauvaise).*

Porte-Corne. *Klein.*

Les Hébreux l'appellent REEM. *Gesn.*

Les Chaldéens, KARAS, ou KARASCH. *Gesn.*

Les Grecs, ΠΙΝΟΨΟΣ.

Les Perses, ELKERKEDOM. *Klein.*

Les Italiens, RHINOCEROTE. *Klein.*

Les Polonois, NOZOROZEC; ZEBATI. *Klein.*

Les Suédois, ENHÖRNING. *Linn.*

Les Habitans du Cap de B. Esp. TUABBA; NABBA. *Klein.*

Les Indiens, SANDA BENAMET. *Gesn. GOMELA. Klein.*

Les Habitans de Java, ABADA; NOEMBA. *Klein.*


Il a, depuis la partie supérieure du dos jusqu'à terre, environ 6 pieds ; depuis le bout du museau jusqu'à la queue, environ 12 pieds : le tour de son corps est égal à sa longueur. Sa tête est oblongue ; ses yeux petits ; ses oreilles semblables à celles d'un Cochon : sa lèvre supérieure, qu'il peut étendre & retirer à volonté, est beaucoup plus longue que l'inférieure, & pointue. Il porte une corne sur le nez ; (Quelques Au-

A parte superiore dor-
terram usque, 6 pedes o-
ter altus est ; ab extrem-
oris ad caudam, 12 pedes
citer longus : ambitus cor-
ris longitudini æqualis.
put habet oblongum ; oc-
parvos ; auriculas porcini-
miles ; labium superius, quod
extendere & contrahere
test, inferiore multò longius
& valdè acutum ; in naso cor-
nu unum, (quandoque dicitur
secundùm Authores quod

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre VIII.

(dam) ; caudam 2 pedes longam. Cutis ex cinereo nigrescit, estque admodum rugosa, cum profundis plicaturis in collo, dorso, lateribus & cruribus. Pilos non habet, nisi in caudâ, & auriculis. Habitat in *Africa* desertis, inque regnis *Bengala*, & *Patana* *Asia*.

teurs prétendent qu'il en a quelquefois deux). Sa queue est longue de 2 pieds. Sa peau est gris presque noir, très raboteuse, avec des plis considérables, au col, sur le dos, aux côtés, aux jambes. Il n'a des poils qu'aux oreilles, & à la queue. On le trouve dans les déserts de l'*Arabie*, & dans les Royaumes de *Bengale*, & de *Patane* en *Asie*.



R E G N U M
A N I M A L E
I N

C L A S S E S IX.

D I S T R I B U T U M,

S I V E

S Y N O P S I S M E T H O D I C A

Sistens generalem *Animalium* distributionem in Clas-
ses IX, & duarum primarum Classium, *Quadrupede-*
dum scilicet & *Cetaceorum*, particularem divisi-
onem in Ordines, Sectiones, Genera & Species.

Cum brevi cujusque Speciei Descriptione, Citationibus
Autorum de iis tractantium, Nominibus eis ab ipsis
& Nationibus impositis, Neminibusque vulgaribus.

A. D. B R I S S O N,

Historiæ Naturalis Musei Realmuriani Demonstratore,
& Regiæ Scientiarum Academiæ Socio.

Editio altera auctior.



LUGDUNI BATAVORUM,
Apud THEODORUM HAAK;

MDCCLXII.

Porco domestico magnitudine cedit. Collum habet breve & crassum; auriculas erectas, & acuminatas; 3 circiter pollices longas; oculos parvos; caudam nullam. Corpus undique oblitum est setis *porcinis* crassioribus, e nigro canescentibus, vel e nigro & incano variegatis; quæ setæ in imis lateribus breviores, paulatim longitudine augentur ad medium usque dorsum, ubi nonnullæ 5 aut 6 digitos longæ sunt. Ab aliis hujus generis speciebus præcipue differt folliculo, quem versus clunes in dorso gerit, ex quo ingrati odoris liquor emanat. Habitat in *Mexico, Guiana, & Brasilia.*

O R D O V I I I .

QUADRUPEDA Dentibus incisivis in utraque maxilla, & tribus digitis unguatis in singulis pedibus donata.

RHINOCEROS solus hunc Ordinem constituit.

XVI. Genus *Rhinocerotis.*

Hujus character est

Dentes incisores in utraque maxilla duo, a se invicem plurimum remoti:

In singulis pedibus digiti tres unguati:

Cornu in naso.

Obs. Uniuscujusque maxillæ pars anterior aliquo modo planæ est, vel potius quasi quadratim truncata; & unusquisque dens incisivus in angulis ex partibus maxillarum anterioribus & lateralibus confectis, situs est. Dentes caninos non habet; sed 12 sunt molares in utraque maxilla, 6 utrinque.

* * I. R H I N O C E R O S . †

LE RHINOCEROS.

Rhi-

QUADRUPEDA. Ordo VIII. Genus XVI. 79

Rhinoceros cornu unico conico. Linn. Syst. Nat. Ed. 6. g. 25. sp. 1. Rhinoceros. Raj. Syn. Quadr. p. 122. Klein. Quadr. p. 26. Gesn. Quadr. p. 952. Fig. p. 953. (Fig. mala) Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 60. (Fig. mala). Aldro. Quadr. Bis. p. 878. Fig. p. 884. (Fig. mala). Jonst. Quadr. p. 66. Fig. T. 38. (Fig. mala). Mus. Worm. p. 336. Charlet. Exerc. p. 12. Abada, sive Rhinoceros. Bont. Ind. Or. p. 50. Fig. p. 51. (Fig. sat bona, si digiti unguati essent). Naricornis Catalani. Klein. Rhinoceros. Kolbe. Tom. III. p. 13. Fig. p. 14. (Fig. mauvaise). Porte-Corne. Klein. Les Hébreux l'appellent REEM. Gesn. Les Chaldéens, KARAS ou KARASCH. Gein. Les Grecs, *ῥινόκερος*. Les Perses, ELKERKEDOM. Klein. Les Italiens, RHINOCEROTE. Klein. Les Polonois, NCZOROZEC; ZENATI. Klein. Les Suédois, ENHORNING. Linn. Les Habitans du Cap de B. Esp. TUABBA; NARRA. Klein. Les Indiens, SANDA BENAMET. Gesn. GOMELA. Klein. Les Habitans de Java, ADADA; NOEMBA. Klein.

A parte superiore dorsi ad terram usque, 6 pedes circiter altus est; ab extremitate oris ad caudam, 12 pedes circiter longus: ambitus corporis longitudini æqualis. Caput habet oblongum; oculos parvos; auriculas *porcinis* similes; labium superius, quod extendere & contrahere potest, inferiore multo longius, & valde acutum; in naso cornu unum, (quandoque duo, secundum Auctores quosdam); caudam 2 pedes longam. Cutis ex cinereo nigrescit, estque admodum rugosa, cum profundis plicaturis in collo, dorso, lateribus & cruribus. Pilos non habet, nisi in cauda, & auriculis. Habitat in *Africa* desertis, inque regnis *Bengala*, & *Parane Asia*.