

Frango, 20. V. 1978.

Al P. Unger, Kurt Bauer con
... di August ... 1978
Frango,

GUIDA BREVE DEI MAMMIFERI DELLA SOMALIA

DI
UGO FUNAIOLI

con 17 tavole fuori testo in nero e a colori, 9 cartine
di distribuzione, 24 disegni dell'autore

pp. 1-232



(6618)

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE
BIBLIOTECA AGRARIA TROPICALE
1971

Famiglia RINOCEROTIDI: *Rhinocerotidae*

I caratteri della famiglia sono indicati nella chiave sopra esposta.

Rinoceronte

Diceros bicornis (L.)

Tav. IX, fig. 1

Nomi somali: Uhil; Uiyi.

Inglese: Black Rhinoceros.

Distribuzione: Ristretta ormai a poche aree del basso Oltregiuba e del corso inferiore dell'Uebi Scebeli ove il numero degli esemplari presenti è molto incerto e, in ogni modo, estremamente esiguo, in imminente pericolo di estinzione totale. In Africa diffuso specialmente nella parte centro-orientale, dallo Zambesi al Sudan, ma in modo discontinuo ed in fatale diminuzione.

Per la distribuzione in Somalia vedi anche cartina A a pag. 115.

Misure: Testa e corpo mm 2800-3000; coda mm 600-700; altezza garrese mm 1500-1600.

Dopo l'elefante, è il più grosso mammifero terrestre della fauna somala. Ben noto nei suoi caratteri essenziali: corpo massiccio, grigiastro, all'apparenza nudo; testa armata di due sporgenze cornee variamente sviluppate, poste sul dorso del muso; arti brevi, terminanti in tre dita coperte di zoccoli; labbro superiore appuntito, prensile; occhi piccoli; orecchie piuttosto ampie, a forma d'imbuto.

Vive solitariamente o in gruppo familiare (genitori con piccolo) in ambienti di boscaglia ricchi di cespugli e di stagni di acqua. Generalmente bruca di notte o all'alba le foglie ed i rigetti che costituiscono il suo cibo preferito, mentre riposa

gran parte del giorno sdraiato all'ombra di un albero o nel fango di qualche stagno occasionale. Cresce lentamente e si riproduce con pari lentezza. Il periodo di gestazione dura 11-13 mesi e passano poi almeno due anni, dopo la nascita del piccolo (mai più di uno alla volta), prima che s'inizi una nuova gravidanza. Animale sospettoso, di carattere imprevedibile. Se incontrato all'improvviso in boscaglia può partire in una carica nella quale persone ed automezzi possono anche riportare gravi danni. Fortemente perseguitato per i corni nasali i quali, acquistati a caro prezzo da mercanti poco scrupolosi, sono inviati in Estremo Oriente ove si attribuisce loro proprietà afrodisiache, a dir il vero inesistenti. Ora sottoposto ovunque a forte protezione legale.

Famiglia EQUIDI: *Equidae*

Per i caratteri della famiglia, si veda la chiave esposta in precedenza.

Zebra comune

Equus burchelli Gray

Tav. IX, fig. 2

Nomi somali: Ferù; Damér ferù.

Inglese: Burchell's Zebra.

Distribuzione: Oltregiuba centro meridionale, ma in forma estremamente sporadica, tanto che la specie va considerata molto rara. Riguardo al resto dell'Africa, essa è diffusa dall'Orange e l'Angola verso nord-est fino all'Etiopia meridionale.

Per la distribuzione in Somalia vedi anche cartina D a pag. 115.

Misure: Testa e corpo mm 2400 circa; altezza al garrese mm 1200 circa; peso Kg. 200-250.