

## LISTE PROVISOIRE DES MAMMIFÈRES DE L'INDOCHINE FRANÇAISE (suite)

PAR

J DELACOUR  
Associé du Muséum.

### CARNIVORES.

#### 79. *Panthera tigris* subsp.

Le Tigre est commun dans toute l'Indochine. Les exemplaires du Nord sont grands et clairs, comme ceux de l'Inde. Ceux de Cochinchine sont petits et roux comme les malais. Leur étude reste à faire.

#### • 80. *Panthera pardus delacouri* Pocock.

La Panthère, ou Léopard, est également très répandue. Nous avons obtenu une Panthère noire à Xieng-Khouang. Une des races les plus colorées.

#### 81. *Felis nebulosa* Griff.

Répandu dans le Nord et le centre du pays.

#### 82. *Felis temmincki dominicanorum* Sclater.

Assez rare. Obtenu en Annam, au Tonkin et au Laos, en pelage roux ou gris.

#### 83. *Felis viverrina* Benn.

Assez rare. Trouvé dans le Sud de l'Annam et en Cochinchine.

#### 84. *Felis marmorata* Mart.

Assez rare. Obtenu à Xieng-Khouang, à Chapa et à Backan.

#### 85. *Felis bengalensis* Kerr.

Très commun partout.

#### 86. *Felis chinensis* Gray.

Quang-Tri ; très rare et ressemble au précédent.

#### • 87. *Felis affinis fulvidina* Thos.

Nous avons obtenu ce nouveau Chat, apparenté au Chau. entre Kompong-Thom et Tày-Ninh.

#### • 89. *Viverra zibelha surdaster* Thos.

La Grande Civette est commune dans toute l'Indochine, sauf au Cambodge.

#### 90. *Viverra megaspila* Blyth.

Rare. Obtenue seulement à Tày-Ninh.

#### 91. *Viverricula malaccensis* (Gmelin).

La Civette à queue blanche est commune dans le Nord et le centre de l'Indochine.

#### 92. *Pardictis pardicolor* (Hodgs.).

Ce ravissant animal fauve tacheté de noir se rencontre en petit nombre dans le Nord du pays ; obtenu à Xieng-Khouang, Bao-Ha, Chapa, Ngai-Tio et Backan.

#### 93. *Paradoxurus hermaphroditus laotum*. Gyldenstope.

Commun en Indochine.

#### 94. *Paradoxurus crossi* Gray.

Un exemplaire de Long-Lunh. Rare.

#### 95. *Paguma larvata intrudens* Wroughton.

Répandu dans le Nord et le centre de l'Indochine.

#### 96. *Arctogalidia leucotis* (Horsf.)

Trouvé à Xieng-Khouang et aux Bolovens.

#### 97. *Arctitis binturong* (Raff.).

Trouvé au Tonkin, à Phuqui et en Cochinchine.

#### 98. *Chrotogale owstoni* Thos.

Cet extraordinaire animal, au dos marqué de larges bandes transversales noires et gris clair, au museau très fin et très aplati, au cou large et curieusement tacheté, demeure une des grandes raretés de la faune indochinoise. La dentition est très particulière. Un seul exemplaire jeune, le type, fut trouvé dans le Nord du Siam.

(1) Voir le début de ce travail dans *Mammalia*, t. IV, n° 1, 1940, p. 20-29.

183. *Hapalomys pasquieri* Thos.

Trouvé à Xieng-Khouang et Phong-Saly. Beaucoup plus petit que le précédent.

184. *Eothenomys melanogaster confini* Hinton.

Assez nombreux à Chapa.

185. *Rhizomys pruinosus senex* Thos.

Ce Rat de bambous est commun dans tout le Nord et le centre du pays jusqu'à Kontoum et à Hué. Deux jeunes de Kontoum étaient blanc pur avec les yeux noirs.

186. *Nyctocleptes sumatrensis cinereus* (Mac Clell.).

Ce gros Rat de bambous à face jaune est commun, mais très localement trouvé, au Haut Laos, à Hoi-Xuan et aux Bolovens.

\* 187. *Atherurus macrourus stevensi* Thos.

Ce Porc-épic a été trouvé à Chapa, Thua-Luu et dans tout le Laos. Assez commun.

188. *Acanthion brachyurus subcristatus* (Swinh.).

Le grand Porc-épic est assez commun en Indochine du Nord au Sud.

189. *Lepus peguensis vassali* Thos.

Ce Lièvre est commun depuis Quang-Tri jusqu'au Cambodge.

190. *Lepus peguensis siamensis* Bonhote.

Moyen et Bas Laos.

## ONGULÉS.

191. *Sus cristatus jubatus* Miller.

Le Sanglier est commun dans toute l'Indochine. Nous avons ramené des exemplaires de Djiring et de Phuquóc.

192. *Rhinoceros sumatrensis lasiotis* Sclater.

Un de ces animaux a vécu quelque temps aux environs de Lao-Bao. Nous avons vu récemment une très belle double corne près de Nong-Het (Haut-Laos). Il est peut-être éteint en Indochine actuellement. Il paraît avoir été surtout trouvé dans le Nord.

193. *Rhinoceros sondaicus* Desmarest.

Ces animaux existent encore en Indochine, mais en très petit nombre et dans le Sud.

Il est aussi possible que le Tapir Malais (*Tapirus indicus*) se rencontre parfois dans le Sud de l'Indochine, mais c'est un animal timide, très difficile à surprendre.

194. *Elephas maximus* subsp.

L'Éléphant est répandu dans le Sud et le centre de l'Indochine, jusqu'au Tonkin. Il n'existe pas à l'état sauvage au Haut-Laos.

195. *Bibos gaurus* subsp.

On trouve des Gaurus depuis le Cambodge et le Sud de l'Annam jusqu'à la Chine, tout le long de la Chaîne Annamitique. Le désordre que les travaux du R. P. Heude ont apporté dans la nomenclature des races de cette espèce et de *B. banteng* empêche de pouvoir appliquer un nom subs spécifique aux Bœufs sauvages de l'Indochine. Il s'y trouve probablement plusieurs races.

196. *Bibos sauveli* Urbain.

Le très curieux Kouprey est confiné au N.-E. du Cambodge. C'est un des animaux les plus intéressants et les plus rares de l'Asie.

197. *Bibos banteng* subsp.

Le Banteng habite le Sud de l'Annam, la Cochinchine et le Cambodge. Il existe aussi en Indochine des bœufs ordinaires retournés à l'état sauvage.

198. *Bubalis bubalis* (Lin.).

Il paraît certain que les Buffles sauvages du Sud de l'Indochine sont indigènes.

199. *Capricornis sumatrensis maritimus* Heude.

Le Capricorne habite tous les rochers de l'Indochine du Nord et du centre. Il est abondant en Baie d'Along, au Tranninh, à Langson, dans les provinces de Vinh, Thanh-Hoa, Doughoi et Quang-Tri. Fort difficile à approcher.

200. *Racervus eldi siamensis* (Lydekker).

Le Cerf d'Eld habite les clairières et les plateaux découverts des régions méridionales. Il décroît rapidement en nombre, se défendant mal.

201. *Rusa unicolor equinus* (Cuvier).

Le Cerf Rusa est très commun dans toutes les parties boisées de l'Indochine.