

TH. HALTENORTH UND W. TRENSE

Das Großwild der Erde *und seine Trophäen*

910

Mit 12 Farbtafeln und 190 Habituszeichnungen von

HELMUTH DILLER

103 Trophäenzeichnungen sowie 6 Karten



Bayerischer Landwirtschaftsverlag Bonn München Wien 1956

910

NASHÖRNER *Rhinocerotidae*

SPITZMAULNASHORN (fälschlich SCHWARZES NASHORN) *Diceros bicornis* (Linné, 1758)
Abb. 141

Black Rhinoceros Le Rhinocéros Bicorne Ordinaire, Le Rhinocéros Noir

Verbreitung In ganz Afrika südlich der Sahara außer Westsudan und westafrikanischem Regenurwald

Lebensweise Einzelgängerischer Laub und Gezweig äsender, sehr standortstreuer Unpaarhufer der Buschsteppe in Ebene und Gebirge


Unterarten GEWÖHNLICHES SPITZMAULNASHORN *Diceros bicornis bicornis* (Linné, 1758)

Verbreitung: Wie Art, außer Somaliland *Bestand:* In kultivierten Landschaften ausgerottet (z. B. in größten Teilen Südafrikas), sonst gesichert


SOMALI-SPITZMAULNASHORN *Diceros bicornis somaliensis* (Potocki, 1900)

Verbreitung: Somaliland und Ogaden (Südostabessinien) *Bestand:* Gefährdet

Formel zum Vermessen und Bewerten s. unter Breitmaulnashorn S. 207



141 Gewöhnliches Spitzmaulnashorn *Diceros bicornis bicornis*



142 Südliches Breitmaulnashorn *Diceros simus simus*

BREITMAULNASHORN (fälschlich WEISSES NASHORN) *Diceros simus* (Burchell, 1817)
Abb. 142

Wide Mouthed Rhinoceros, White Rhinoceros Le Rhinocéros de Burchell, Le Rhinocéros Blanc

Verbreitung Zentralsudan bis Nordkongo, Südafrika; Zululand

Lebensweise Einzelgängerischer Gras und Kraut äsender, sehr standortstreuer Unpaarhufer der Gras- und Buschsteppe in Ebene und Hügelland

Unterarten NÖRDLICHES BREITMAULNASHORN *Diceros simus cottoni* (Lydekker, 1908)

Verbreitung: Zentralsudan, Ost-Ubangi-Schari, Nord-Uëlle-Gebiet *Bestand:* Selten. Im Sudan gefährdet, sonst gesichert

SÜDLICHES BREITMAULNASHORN *Diceros simus simus* (Burchell, 1817)

Verbreitung: Südostangola, Zululand *Bestand:* Selten. In Angola sehr gefährdet, in Zululand gesichert

Formel zum Vermessen und Bewerten der Nashörner (Madrid 1952)

Messung mittels Maßband in cm bis auf 1 mm genau. Gemessen werden beide Nasenhörner

<i>Beispiel</i>	Länge des Vorderhorns entlang der äußeren Kurve	in cm × 1	61,6
	Länge des Hinterhorns entlang der äußeren Kurve	in cm × 1	34,5
	Umfang des Vorderhorns an der Basis	in cm × 1	46,3

Umfang des Hinterhorns an der Basis	in cm × 1	41,5
Umfang des Vorderhorns im 2. Drittel	in cm × 1	37,8
Umfang des Hinterhorns im 2. Drittel	in cm × 1	27,5
Umfang des Vorderhorns im 3. Drittel	in cm × 1	27,3
Umfang des Hinterhorns im 3. Drittel	in cm × 1	20,5
	Wertziffer	297,0

SCHWEINE *Suidae*

NORDAFRIKANISCHES ODER BERBER-WILDSCHWEIN *Sus scrofa barbarus* Sclater, 1860
Barbary Pig Le Sanglier de l'Atlas

Verbreitung Rio de Oro, Marokko, Algier, Tunis, Ägypten, Nubien und Kordofan

Lebensweise S. unter Wildschwein in Europa S. 54

Bestand In Ägypten um 1900 ausgerottet. In Atlasländern z. T. schon selten

Formel zum Vermessen und Bewerten s. unter Wildschwein in Europa S. 55

Weitere Wildschwein-Unterarten s. unter Europa und Asien S. 54 und III

AFRIKANISCHES BUSCHSCHWEIN ODER FLUSSSCHWEIN *Potamochoerus porcus* (Linné, 1758)
Abb. 143

African Bush-Pig Le Potamochère de l'Afrique

Verbreitung Afrika von südlich der Linie Liberia-Abessinien ab südwärts bis Kap

Lebensweise Rottenweise in oder bei Gewässerrändern, Sümpfen, in feuchterem Dickicht oder Wäldern umherziehender allesfressender, nichtwiederkäuender Paarhufer in Ebene, Hügelland und Gebirge

Unterarten GUINEA-BUSCHSCHWEIN *Potamochoerus porcus porcus* (Linné, 1758)

Verbreitung: Guinea bis Nigeria Bestand: Gesichert

KAMERUN-BUSCHSCHWEIN ODER PINSELSCHWEIN *Potamochoerus porcus pictus* (Gray, 1852)

Verbreitung: Kamerun Bestand: Gesichert

UBANGI-BUSCHSCHWEIN *Potamochoerus porcus ubangensis* Lönnberg, 1910

Verbreitung: Ubangi-Schari-Gebiet bis Nordkongo Bestand: Gesichert