

E. KELLER

De Neushoorn in Borneo.

*De Tropische Natuur*, jaargang 21, afl. 12, Dec. 1932  
pp. 229.

In de October-aflevering [Witkamp 1932] van dit tijdschrift bespreekt de heer Witkamp het voorkomen van een aantal diersoorten in het landschap Koetai. Naar aanleiding daarvan meen ik een kleine rechtzetting met betrekking tot de verbreiding van de neushooren niet achterwege te mogen laten.

In het bewuste artikel werd o.a. als vaststaand aangenomen, dat ten zuiden van de mahakam deze diersoort niet meer zou voorkomen, hetgeen ik verplicht ben te weerleggen, daar ik gedurende mijn opmetingswerkzaamheden tusschen Balikpapan en Samarinda niet alleen vle oude en meerdere versche sporen van de neushoorn heb aangetroffen, doch zelfs een respectabel exemplaar heb gezien. Bij het nameten van een van diens duidelijke voetafdrukken, bleek deze een doorsnede te bezitten van meer dan 20 cm. De plaats waar ik het dier [in een poel] aantrof ligt  $\pm$  30 km ten zuiden van de mahakam, in het brongebied van de Soengai kembodja en de Soengai Nangka, dat weer  $\pm$  30 km van de kust verwijderd is.