

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ТРУДЫ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Т о м 193

Е.Л. ДМИТРИЕВА, С.А. НЕСМЕЯНОВ

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
И СТРАТИГРАФИЯ
КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ
ТРЕТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ЮГО-ВОСТОКА
СРЕДНЕЙ АЗИИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО "НАУКА"

Москва 1982

DMITRIEVA E.I. & NESMEYANOV S.A., 1982

Mlekopitayushchie i Stratigrafya Kontinental'nykh Tretichnykh Otlozheniy
Yugo-Vostoka Sredney Asii

[Mammals and Stratigraphy of Tertiary Continental Sediments of South-East Middle Asia]
[in Russian]. *Trudy PIN AN SSSR*, **193**: 1-138, Izd-vo "Nauka", Moskva.

Pars secunda

pp. 110-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137
Pliocene faunal complexes (tab 15), p. 110; **alphabetical list of the species**, p. 120-121
Литература (Literature), pp. 122-137

Фауна	Главные формы млекопитающих
Лахутинская	<i>Hyaena cf. brevirostris</i> Aym., <i>H. cf. sinensis</i> Zd., <i>Pantera cf. gombaszo-gensis</i> (Kr.), <i>Equus caballus cf. mosbachensis</i> Reich., <i>Dicerorhinus cf. etruscus</i> (Falc.), <i>D. cf. mercki</i> (Jäg.), <i>Camelus cf. knoblochi</i> Pol., <i>Cervus elaphus</i> L.
Кокторлюкская	<i>Anancus arvernensis</i> (Cr. et Job.), <i>Archidiskodon meridionalis meridionalis</i> (Nesti), <i>Elasmotherium sp. (caucasicum?)</i> Bor., <i>Equus stenonis</i> Cocchi.
Куруксайская	<i>Paradolichopithecus sp.</i> , <i>Promimomys cf. baschkirica</i> Suchov, <i>Hystrix sp.</i> , <i>Canis ex gr. aureus</i> L., <i>Nyctereutes sp.</i> , <i>Hyaena cf. perieri</i> Cr. et Job., <i>Euryboas cf. lunensis</i> (Del Camp.), <i>Felis (Lynx) issiodorensis</i> Cr. et Job. aut <i>shansius</i> Teilh., <i>Meganthereon meganthereon</i> (Cr. et Job.), <i>Homotherium cf. crenatidens</i> Fabr., <i>Ursus etruscus</i> Cuv., <i>Anancus arvernensis</i> (Cr. et Job.), <i>A. sinensis</i> Hopw., <i>Archidiskodon cf. gromovi</i> Gar. et Alex. aut <i>Protelephas planifrons</i> (Falconer et Cautley), <i>Equus stenonis</i> Cocchi, <i>E. cf. hidruentinus</i> Red., <i>Dicerorhinus sp.</i> , <i>Paracamelus cf. praebactrianus</i> (Orl.), <i>Cervus sp.</i> , <i>Elaphurus sp.</i> , <i>Eucladocerus sp.</i> , <i>Megacerini</i> , <i>Alcini</i> , <i>Sivatherium sp.</i> , <i>Sogdianotherium kuruksaense</i> Schar., <i>Gazella parasinensis</i> Dmitr., <i>Protoryx paralaticeps</i> Dmitr., <i>Damalops palaeindicus</i> (Falc.), <i>Gazelospira gromovae</i> Dmitr.
Есекартканская	<i>Castor fiber</i> L., <i>Ictitherium cf. wongii</i> Zd., <i>I. cf. hipparionum</i> (Gerv.), <i>Anancus kazakhstanensis</i> Aub., <i>Hipparion houfenense</i> Teilh. et Young., <i>Dicerorhinus orientalis</i> (Schl.), <i>Chilotherium cf. anderssoni</i> Ringstr., <i>C. aff. gracile</i> Ringstr., <i>Gigantocamelus longipes</i> Aub., <i>Cervavitus flerovi</i> Aub., <i>Sinomegaceros sp.</i> , <i>Palaeotragus sp.</i> , <i>Samotherium sp.</i> , <i>Gazella sinensis</i> Teilh. et Piv., <i>G. ex gr. dorcadoides</i> Schl., <i>Antilospira</i> , <i>Tragocerus?</i>
Ортокская ¹	<i>Ictitherium cf. wongi</i> Zd., <i>I. robustus</i> Nord., <i>Crocota eximia</i> Roth. et Wagner, <i>Sogdohyrax soricus</i> Dubr., <i>Hipparion dermatorchinum</i> Sefve, <i>H. garedzicum magianense</i> Zheg., <i>Chilotherium sp.</i> , <i>C. cf. haberi</i> Ringstr., <i>Microstonyx major</i> (Gerv.), <i>Samotherium cf. irtysheense</i> God., <i>Palaeotragus asiaticus</i> God., <i>Procervus variabilis</i> Alex., <i>G. dorcadoides</i> Schl., <i>Torticornis ortokensis</i> Dmitr., <i>Protoryx tadjhikistanica</i> Dmitr., <i>Tragocerus amaltheus</i> Gaudry.

¹ Ортокская фауна имеет позднемiocен-раннеплиоценовый возраст.

Вангенгейм, 1977; и др.), позволило констатировать в этих областях следующие фаунистические подразделения (см. табл. 1). Для местонахождений Андарак и Торуйгыр, доминирующими формами в которых являются тапиры — тапиroidный комплекс¹. Для Боктыкарынского местонахождения и нижнего слоя Актау с ведущими формами гигантских носорогов — индрикотериевый комплекс, а для среднего слоя Актау и Асказансора — асказансорский комплекс. Аральская, кушукская и анхитериевая фауны, известные в более северных районах Казахстана, в исследуемых регионах не представлены. По-видимому, более молодыми являются две находки мастодонтов — среднемиоценовая Белькарасуйская (*Platybelodon grangeri* (Osб.)) и средне-позднемиоценовая Аруктауская (*Mastodon cf. angustidens* (Cuv.)). Гиппарионовый комплекс представлен в нижнем слое Белдерсайского местонахождения, Джуанарыке, Ортоке, Жабыртау, Сатах (нижнем слое), Серафимовке (Джельдысуйском слое), Соре, Ташбулаке, Танхиздарье. Несмотря на то, что гиппарионовый комплекс обычно занимает большой стратиграфический интервал (по крайней мере, сарматский, мэотический и понтический ярусы), имеющийся палеонтологический материал не позволяет пока уточнить возраст отдельных местонахождений. Не позволяет он уточнить и общий возрастной интервал перечисленных местонахождений, которые условно объединяются в ортокскую фауну (табл. 15).

¹В некоторых работах (Синицын, 1967) его именуют бронтотериевым.

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ

A
 Aceratherium depereti
 Alcini
 Allaceropinae
 Allohippus cf. stenonis
 Allophaiomys
 Amphicyoninae
 Amynodontidae
 Anancus arvernensis
 A. kazachstanicus
 A. sinensis
 Anchitherium sp.
 Antilospira sp.
 Antracotherium sp.
 Archidiskodon cf. gromovi
 A. gromovi
 A. cf. meridionalis meridionalis
 A. meridionalis
Ardynia kazachstanica
 Artiodactyla
 Asinus sp.

B
 Bison sp.
 Bovidae
 Bovinae
 Brachyodus
 Brachypotherium
 Brontotheriidae

C
 Camelidae
 Camelus cf. knoblochi
 Canidae
 Canis arnensis
 C. aureus
 C. cf. lupus
 C. lupus mosbachensis
 C. sp.
 Capreolus
 Carnivora
 Castor fiber
 Cervidae
 Cervavitus flerovi
 Cervus elaphus
 C. cf. elaphus
 C. bactrianus
 C. sp.
 Chalicotheriidae
 Chalicotherium sp.
 Chilotherium anderssoni
 C. cf. anderssoni
 C. aff. gracile
 C. habereri
 C. cf. schlosseri
 C. sp.
 Clethrionomys
 Condylarthra
 Conohyus betpakdalensis

Creodonta
 Cricetops cf. dormitor
 Cricetulus sp.
 Cricetus sp.
 Crocidea
 Crocidea sp.
 Crocuta eximia
 C. sp.

D
 Damalops palaeindicus
Desmatotherium sp.
Deperetella ferganica
 D. kungeica
 Dicerorhinus etruscus
 Dicerorhinus cf. etruscus
 D. cf. mercki
 D. orientalis
 D. sp.
 D. tagicus
 Dichobunidae
 Dicrocerus sp.

E
 Elaphurus sp.
 Elasmotherium sp. (caucasicum?)
 Elephantidae
 Elephas cf. meridionalis
 Ellobius sp.
 E. primigenius
 E. aff. talpinus
 Entelodontidae
 Equidae
 Equus caballus cf. mosbachensis
 E. cf. hidruntinus
 E. ex gr. sanmeniensis
 E. sp.
 E. stenonis
 E. ex gr. stenonis
 E. cf. stenonis
Ergilia kazachstanica
 Erinaceomorpha
 Eucladocerus sp.
 Euryboas cf. lunensis

F
 Felidae
 Felis issiodorensis
 F. shansius
 F. sp.
 Fissipedia
 Forstercooperia

G
 Gazella deperdita
 G. dorcadoides
 G. ex gr. dorcadoides
 G. cf. gutturosa
 G. parasinensis
 G. sinensis
 G. sp.
 G. cf. subgutturosa

Gazellinae
 Gazellospira gromovae
 G. sp.
 Gelocidae
 Gigantocamelus longipes
 Gobiatherium mirificum
 Gomphotheriidae

H
Heleales (Desmatotherium) mon-
goliensis
 Hemimeryx sp.
 H. turgaicus
 Hipparion dermatorhinum
 H. garedzicum magianense
 H. houfense
 H. kirgisicum
 H. cf. moldavicum
 H. cf. parvum
 H. sp.
 Hippotraginae
 Homotherium cf. crenatidens
 H. dorvasicum
 H. sp.
 Hyaena sp.
 Hyaena cf. brevisrostris
 H. cf. perrieri
 H. cf. sinensis
 H. sp.
 Hyaenidae
 Hyaenodon sp.
 Hypolagus brachygnatus
 Hyracodontidae
 Hyracidea
 Hystrix

I
 Ictitherium cf. hipparionum
 I. robustum
 I. sp.
 I. cf. wongi
 Indarctos
 Indricotheriidae
 Indricotherium sp.
 Insectivora

J
 Jiraffidae

L
 Lagomeryx satensis
 Lagomorpha
 Leporidae
 Leporinae
 Lepus sp.
Lophialetes expeditus
 Lophialetidae
 Lophiomeryx turgaicus
 Lushiamynodon kirgisensis
 Lushiamynodon sp.

M
 Machairodontinae
 Machairodus sp.
 Mastodon cf. angustidens
 M. sp.
 Mastodontidae
 Mastodontoidea
 Megacerini
 Megaloceros sp.
 Megantereon megantereon
 Meriones sp.
 Mesocricetus sp.
 Microstonyx major
 Microtus (Phaiomys) sp.
 Mimomys sp.
 M. (Mimomys) aff. intermedius
 M. (Tianshanomys) major
 M. (Tianshanomys) antis
 Moschus cf. moschiferus

N
 Nyctereutes sp.
O
 Ochotona sp.
 Ochotonoides complicidens
 Ovis ammon
 Ovis cf. ammon

P
 Palaeotragus asiaticus
 P. sp.
 Panthera cf. gombaszoegensis

P. sp.
 Paracamelus cf. gigas
 P. cf. praebactrianus
 Paraceratherium
 Paradolichopithecus sp.
 Paramyidae
 Pataecops microdon
 Perissodactyla
 Petrokozlovia cf. notos
 Phaiomys sp.
 Meriones sp.
 Phyllotillon betpakdalensis
 Platybelodon grangeri
 Praemegaceros
 Primates
 Proboscidea
 Procervus variabilis
 Proremotherium sp.
 Promimomys cf. baschkirika
 Proochotona kurdjukovi
 P. kirgisica
 P. sp.
 Protelephas planifrons
 Prothyracon zhukovi
 Protoryx paralaticeps
 P. sp.
 P. tadjikistanica
 Pseudaxis

R
 Rhinoceros sp.
 Rhinocerotidae
Rhodopagus minutissimus
 Rodentia

S
 Samotherium sp.
 Schizotherium turgaicum
 S. sp.
 Schlosseria
 Sciuravidae
 Simplicidentata
 Sinomegaceros sp.
 Sinotherium sp.
 Sivatherium sp.
 Sogdianotherium kurksaense
 Sogdohyrax soricus
 Suidae
 Suiformes
 Sus

T
 Tamquammys sp.
Teleolophus sp.
 Tianshanomys
 Torticornis ortokii
 Tragelaphinae
 Tragocerus amaltheus
 T. sp.
 Tragoreas
 Tragulidae
 Tylopoda

U
 Ursidae
 Ursus etruscus
 U. sp.

X
 Xenocuoan sp.

ЛИТЕРАТУРА

- Абдрахманова Л.Т.* Палеогеновые и неогеновые жвачные на территории Казахстана: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. Алма-Ата, 1973. 25 с.
- Абузярова Р.Я.* Спорово-пыльцевые комплексы эоценовых отложений Туркмении (Бадхыз). – Ботан. журн., 1956, 41, № 9, с. 1339–1345.
- Абузярова Р.Я.* Спорово-пыльцевые комплексы третичных отложений Северного Тянь-Шаня (р. Саты). – В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1961, т. 3, с. 94–98.
- Абузярова Р.Я., Тарасов С.А., Салыкулова О.* Некоторые палинологические данные по неогеновым отложениям Кочкорской впадины. – В кн.: Материалы по новейшему этапу геологического развития Тянь-Шаня. Фрунзе: Илим, 1971, с. 10–13.
- Аделунг А.С.* Западная часть Чаткальского хребта, Ангренское плато и восточная оконечность Кураминских гор. – В кн.: Геология Узбекской ССР. М.; Л.: ОНТИ, 1937, т. 1, с. 79–146.
- Аделунг А.С., Иванов Н.В., Силицын Н.М.* Геологическая карта Средней Азии, лист К-42-Г, северо-восточная четверть (Чаткал). Л.; М.: Госгостехиздат, 1940. 295 с.
- Азыкова Э.К.* Развитие растительности и климата Иссыккульской котловины в позднем плиоцене и плейстоцене. – В кн.: Дисперсные остатки ископаемых растений Киргизии. Фрунзе: Илим, 1971, с. 106–116.
- Александровская Н.В., Ерамов Р.А., Игнатев Г.М.* и др. Физическая география частей света. М.: Высш. школа, 1963. 547 с.
- Алексеева Л.И.* О находке *Platybelodon granti* в Киргизии. – *Vertebrata Palasiatica*, 1957, 1, N 3, с. 215–222.
- Алексеева Л.И.* Последовательность смены комплексов млекопитающих в антропогене Восточной Европы. – В кн.: Основные проблемы геологии антропогена Евразии. М.: Наука, 1969, с. 36–46.
- Алексеева Л.И.* Терофауна раннего антропогена Восточной Европы. М.: Наука, 1977. 214 с.
- Алешинская З.В., Азыкова Э.К.* История растительности и климата Иссыккульской котловины в позднем плиоцене и плейстоцене. – В кн.: Палинология плейстоцена и плиоцена. М.: Наука, 1973, с. 150–153.
- Алешинская З.В., Бондарев Л.Г., Воскресенская Т.Н., Лефлат О.Н.* Разрез новейших отложений Иссыккульской впадины. М.: Изд-во МГУ, 1971. 164 с.
- Алешинская З.В., Воскресенская Т.Н., Куликов О.А., Фаустов С.С.* О стратиграфическом положении шайылдагской свиты в свете палеомагнитных данных. – Вестн. МГУ. Сер. 5, География, 1972, с. 106–107.
- Алешинская З.В., Куликов О.А., Мотузко А.Н.* и др. К палеогеографии и стратиграфии новейших отложений Иссыккульской впадины. – В кн.: Проблемы общей физической географии и палеогеографии. М.: Изд-во МГУ, 1976, с. 211–225.
- Али-Заде А.А.* Акчагыл Туркменистана. М.: Госгеолтехиздат, 1961. Т. 1. 300 с.
- Алисов Б.П.* Климат СССР. М.: Высш. школа, 1969. 104 с.
- Алферов Г.Ю.* Стратиграфия неогеновых отложений западной части Узбекистана. – В кн.: Палеонтологическое обоснование стратиграфии мезозойских и кайнозойских отложений Узбекистана. Ташкент: Фан, 1969, вып. 8, с. 165–195.
- Алферов Т.Ю., Данилов В.Г., Авербург Н.В.* и др. Западный Узбекистан: Неогеновая система. – В кн.: Геология СССР. М.: Недра, 1972, т. 23, кн. 1, с. 608–620.
- Алферов Г.Ю., Козай Н.А., Скоорцов Ю.А.* и др. Четвертичные отложения Узбекской ССР. – В кн.: Основные проблемы изучения четвертичного периода. М.: Наука, 1965, с. 108–115.
- Аубекерова П.А.* Плиоценовая фауна юго-востока Казахстана. – В кн.: Материалы первой науч. конф. молодых ученых АН КазССР. Алма-Ата, 1968, с. 278–279.
- Аубекерова П.А.* Некоторые черты экологии Есескартканской фауны. – В кн.: Первое Всесоюз. совещ. по палеобиогеохимии и палеозоологии: (Тез. докл.). Баку, 1969, с. 79–80.
- Аубекерова П.А.* О фауне плиоценовых позвоночных из Есескарткана. – В кн.: Природная обстановка и фауны прошлого. Киев: Наук. думка, 1973, вып. 7, с. 137–140.
- Аубекерова П.А.* Поздненеогеновая фауна Текесской впадины: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. Алма-Ата, 1974а. 22 с.
- Аубекерова П.А.* Новый гигантский верблюд из плиоценовых отложений Текесской впадины. – В кн.: Фауна и флора из мезокайнозой Южного Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1974б, с. 74–82.
- Аубекерова П.А.* Новый вид мастодонта (*Alpancus kazachstanensis Aubekegova*) из местонахождения Есескарткан. – В кн.: Териология. Новосибирск: Наука. 1974в. т. 2, с. 65–77.
- Аубекерова П.А.* Плиоценовые парноπαлыс Юго-Восточного Казахстана. – Палеонтол. журн., 1974г, 4, с. 92–100.
- Аубекерова П.А.* О находке остатков оленя рода *Sipotegaceros* в Казахстане. – Вестн. АН КазССР, 1975, с. 8–9.
- Аубекерова П.А., Лычев Г.Ф.** Ископаемые бобры Казахстана. – В кн.: Ископаемая фауна и флора Центрального и Восточного Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1971, т. 5, с. 12–33.
- Аубекерова-Глеубердина П.А.* Сопоставление есескартканской фауны с гиппарионовыми и позднегиппарионовыми фаунами Азии. – В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1977, т. 7, с. 75–81.
- Бабадаглы В.А.* Литология кайнозойских моласс Придарвазья. Л.: Недра, 1964. 247 с.
- Бабаев А.М.* Находка ископаемых костей носорога, антилопы и лошади в Таджикской депрессии. – Докл. АН ТаджССР, 1962, 5, № 4, с. 37–38.
- Бабаев А.М.* Неотектоника западной части Каратегинского хребта и смежной территории Таджикской депрессии: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. Душанбе, 1968. 23 с.
- Бабаев А.М.* Новейший тектогенез зоны сочленения Гиссаро-Алая и Таджикской депрессии. Душанбе: Дониш, 1975. 151 с.
- Бабков К.В., Кухмазов У.А.* Остатки мастодонта в Таджикской депрессии. – Сообщ. Тадж. фил. АН СССР, 1950, 26, с. 3–4.
- Бажанов В.С.* Обзор истории фауны наземных позвоночных Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1955, т. 1, с. 5–13.
- Бажанов В.С.* К фауне межких млекопитающих конца неогена на месте Заилийского Алатау. – В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1961, т. 3, с. 179–183.
- Бажанов В.С.* Время появления гиппарионов в пределах Казахстана. – В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1962а, т. 3, с. 3–10.
- Бажанов В.С.* История фауны млекопитающих Казахстана: Докл. на соиск. учен. степени д-ра биол. наук по совокупности опубли. работ. Алма-Ата, 1962б. 43 с.
- Бажанов В.С., Корнилова В.С.* Экспедиционные работы отдела палеобиологии за 1957–1960 гг. – В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1961, т. 3, с. 188–190.
- Бажанов В.С., Костенко Н.Н.* Схема стратиграфии третичных отложений Юго-Восточного Казахстана и севера Киргизии в свете палеонтологических данных. – В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1958, т. 2, с. 5–16.
- Бажанов В.С., Костенко Н.Н.* Геологический разрез Джунгарского Актау и его палеозоологическое обоснование. – В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1961, т. 3, с. 47–52.
- Бажанов В.С., Костенко Н.Н.* Atlas руководящих форм млекопитающих антропогена Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1962. 111 с.
- Бажанов О.В., Боcharова Н.И., Диденко-Кислицына Л.К., Костенко Н.Н.* Заилийский район, Южная и Северная Джунгария: (Неогеновая система). – В кн.: Геология СССР. М.: Недра, 1971, т. 40, кн. 1, с. 472–493.
- Бажанов В.С., Пигулевский Н.А.* О некоторых особенностях и возрасте третичных черепов *Eomurogo alpha*. – В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1973, т. 1, с. 87–94.
- Бажанов О.В.* От р. Киикбай до р. Или. – В кн.: Путеводитель по геологическим маршрутам Южного Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1961, с. 48–54.
- Бажанов О.В., Диденко-Кислицына Л.К., Костенко Н.Н.* Заилийский район, Северная и Южная Джунгария: (Палеогеновая система). – В кн.: Геология СССР. М.: Недра, 1971, т. 40, кн. 1, с. 445–454.
- Бакун Н.Н.* Развитие структур северо-западной части Ферганской нефтеносной области. Л.: Госгеолтехиздат, с. 85–89. (Тр. ВНИГНИ; Вып. 35).
- Бакун Н.Н., Вангенгейм Э.А.* О возрасте бактериальной свиты юго-западной Ферганы по палеонтологическим данным. – Докл. АН СССР, 1963, 148, № 2, с. 400–402.
- Балахматова В.Т., Липман Р.Х.* Микрофаунистическая характеристика палеогеновых отложений среднеазиатского сектора Тетиса. – В кн.: Междунар. геол. конгр. 22-я сессия. Докл. сов. геологов. Пробл. 16 Ж. М.: Наука, 1965, с. 62–73.
- Баранов В.И.* Этапы развития флоры и растительности в третичном периоде на территории СССР. М.: Высш. школа, 1959. 364 с.
- Барбачинова В.Н., Пигулевский Н.А.* Пыльца юрской флоры в третичных отложениях Северного Тянь-Шаня. – Изв. АН КазССР. Сер. геол., 1953, 124, вып. 17, с. 131–143.
- Барков Г.С.* Словарь-справочник по физической географии. 2-е изд. М.: Учпедгиз, 1948. 304 с.
- Бархатов Б.П.* К геологии куляйской свиты Таджикской депрессии. – Учен. зап. ЛГУ. Сер. геол., 1957, 9, № 225, с. 214–225.
- Беленький Г.А.* Геологическое строение Приташкентских Чулей. – Тр. Ташк. ун-та. Новая сер., 1961, 181, геол. науки, кн. 16. 183 с.
- Беленький Г.А., Миркамалова С.Х.* Палеогеография мела и палеогена Приташкентской депрессии. Л.: Недра, 1965. 115 с.
- Беленький Г.А., Сикстель Т.А.* Находка гинкговых в верхнетретичных отложениях Приташкентских Чулей. – Докл. АН УзССР, 1952, 5, с. 14–17.
- Белыева Е.И.* О находке *Elephas* в Таджикистане. М.: Изд-во АН СССР, 1936, с. 103–107. (Тр. Палеозоол. ин-та; Т. 5).
- Белыева Е.И.* Первая находка тапирообразного в эоцене Средней Азии. – Бюл. МОИП. Отд. геол., 1962, 37, № 5, с. 142–145.

*В статье: Г.Ф. Лычев, П.А. Аубекерова.

- Белыева Е.И.* К вопросу о географическом и стратиграфическом распространении синотерия (*Mammalia, Rhinocerotidae*). — В кн.: *Ископаемая фауна и флора Монголии*. М.: Наука, 1975, с. 54–60. (Тр. Сов.-Монг. палеонтол. экспедиции; Вып. 2).
- Белыева Е.И., Габуния Л.К.* Новые данные о кавказском платибеодоносе. — Тр. Ин-та палеобиологии АН ГССР, 1960, 5, с. 63–106.
- Белыева Е.И., Курдюков К.В.* О новых находках ископаемых млекопитающих в Северной Киргизии. — Бюл. КИЧП, 1963, 28, с. 76–83.
- Белыева Е.И., Трофимов Б.А.* Палеонтология млекопитающих в СССР после А.А. Бориляка. — Палеонтол. журн., 1962, 4, с. 12–20.
- Белыева Е.И., Трофимов Б.А.* Основные этапы развития фаун наземных третичных млекопитающих Азиатской части СССР. — В кн.: Стратиграфия и палеонтология мезозойских и палеоген-неогеновых континентальных отложений Азиатской части СССР. Л.: Недра, 1967, с. 209–215.
- Белыева Е.И., Трофимов Б.А., Решетов В.Ю.* Основные этапы эволюции млекопитающих в позднем мезозое-палеогене Центральной Азии. — В кн.: Фауна и биостратиграфия мезозоя и кайнозоя Монголии. М.: Наука, 1974, с. 19–45.
- Бирман А.С.* Строение кайнозойской моласс Восточного Копет-Дага. — В кн.: Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек. М.: Изд-во МГУ, вып. 3, с. 128–138.
- Бирман А.С., Жегалло В.И., Расцветаев Л.М.* и др. К истории фауны позвоночных Восточного Копет-Дага. — Бюл. МОИП. Отд. геол., 1968, 1, с. 159–160.
- Бирман А.С., Жегалло В.И., Расцветаев Л.М.* и др. О находке плиоценовых позвоночных в молассовых отложениях Восточного Копет-Дага. — Бюл. МОИП. Отд. геол., 1971, 46, № 2, с. 99–106.
- Бирман А.С., Расцветаев Л.М.* О схеме распространения плиоценовых моласс Центрального и Гурьского Копет-Дага. — Вестн. МГУ. Сер. 4, Геология., 1967, 6, с. 52–56.
- Бирман А.С., Расцветаев Л.М.* Новые данные по стратиграфии неогеновых отложений Восточного Копет-Дага. — В кн.: Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек. М.: Изд-во МГУ, 1969, вып. 2, с. 195–200.
- Бирюков М.Д.* Ископаемые тапирообразные Казахстана и прилегающих территорий: Тез. докл. совещ. по пробл. "Пути и закономерности исторического развития животных и растительных организмов". М.: Наука, 1969.
- Бляхова С.М.* Палинологические комплексы миоценовых отложений гор Актау. — В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1963, т. 4, с. 167–185.
- Бляхова С.М., Мартынова М.Я.* Восточные Кызыл-Кумы, Большой Каратау, отроги Таласского Алатау (палеогеновая система). — В кн.: Геология СССР. М.: Недра, 1971, т. 11, кн. 1, с. 421–428.
- Бобоедова А.А.* Кустанайская свита Тургайского прогиба и ее сопоставление с битекейскими слоями Прищымья. — В кн.: Неогеновые и четвертичные отложения Западной Сибири. М.: Наука, 1968, с. 41–50.
- Бойцова Е.П., Васильев Е.В., Овечкин Н.К.* О границах и объеме олигоцена в Тургайском прогибе и сопредельных районах. Л.: Госгеолтехиздат, 1961, с. 45–52. (Материалы ВСЕГЕИ. Новая сер.; Вып. 43).
- Борисов Б.А.* Стратиграфия верхнего мела и палеоген-неогена Зайсанской впадины. Л.: Госгеолтехиздат, 1963, с. 11–74. (Тр. ВСЕГЕИ. Новая сер.; Т. 94)
- Борисяк А.А.* К филологии *Dicerorhinacae*. — Докл. АН СССР, 1938, 19, № 9, с. 767–770.
- Борисяк А.А.* *Phylotillon (?) betradcalensis* (Flerov). — Докл. АН СССР, 1940, 26, № 8, с. 841–844.
- Борисяк А.А.* Обзор местонахождений третичных наземных млекопитающих. Фрунзе, 1943. 42 с.
- Борисяк А.А.* Халикотерий как биологический тип. — Зоол. журн., 1944, 23, № 4, с. 125–144.
- Борисяк А.А.* Новый представитель халикотериев из третичных отложений Казахстана. М.: Изд-во АН СССР, 1946. 134 с. (Тр. ПИН АН СССР; Т. 13. Вып. 3).
- Борисяк А.А.* Обзор местонахождений третичных наземных млекопитающих СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948, с. 5–35. (Тр. ПИН АН СССР; Т. 15. Вып. 3).
- Борисяк А.А., Белыева Е.И.* Местонахождение третичных наземных млекопитающих на территории СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. 116 с. (Тр. ПИН АН СССР; Т. 15. Вып. 3).
- Борнemann Б.А., Губин И.Е.* и др. Соляные месторождения Юго-Западного Таджикистана. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1935. 118 с. (Тр. Тадж. Памир. экспедиции АН СССР; Вып. 24).
- Босов В.Д.* Литологическая характеристика зон неогеновой аккумуляции Таджикской депрессии. Душанбе, 1963, с. 118–152. (Тр. Ин-та геологии АН ТаджССР; Т. 7).
- Босов В.Д.* О некоторых особенностях палеогеографии южного склона Гиссарского хребта в олигоцен-миоценовое время. — Докл. АН ТаджССР, 1969, 12, № 2, с. 51–54.
- Босов В.Д.* Третичные континентальные отложения Таджикской депрессии и Кухистана. Душанбе: Дониш, 1972. 167 с.
- Браташ В.И., Будников Н.П., Граделов Л.И.* и др. Новые данные по геологии Северного Афганистана. — Геология нефти и газа, 1967, 2, с. 43–48.
- Браташ В.И., Егунов С.В., Печников В.В., Шоломцев А.И.* Геология и нефтегазоносность севера Афганистана. М.: Недра, 1970. 288 с. (Тр. ВНИГНИ; Вып. 80).
- Бузуруков Д.Д.* Фаунистическая характеристика и возраст ханабадских слоев Таджикской депрессии. Л.: Недра, 1964, с. 225–258. (Тр. ВСЕГЕИ. Новая сер.; Т. 102).
- Бурачек А.Р.* Третичные континентальные отложения юго-западного Таджикистана. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1934, с. 49–60. (Тр. Тадж. комплекс. экспедиции 1932 г.; Вып. 4).
- Бурачек А.Р., Чихачев П.К.* Континентальные неогеновые отложения. — В кн.: Геология СССР. М.: Госгеолтехиздат, 1959, т. 24, кн. 1, с. 319–323.
- Быков Б.А.* Очерки истории растительного мира Казахстана и Средней Азии. Алма-Ата: Наука, 1979. 107 с.
- Быкова Н.К.* Комплексы фораминифер морских палеогеновых отложений. — В кн.: Геология СССР. М.: Госгеолтехиздат, 1959, т. 24, кн. 1, с. 316–319.
- Вангенгейм Э.А.* Палеонтологическое обоснование стратиграфии антропогена Северной Азии (по млекопитающим). М.: Наука, 1977. 172 с.
- Вангенгейм Э.А., Алексеева Л.И., Вислобокова И.А.* и др. Фауна млекопитающих позднего плиоцена и эоплейстоцена Южного Таджикистана. — В кн.: Междунар. симпозиум по пробл. "Граница неогена и четвертичной системы". (Тез. докл.). М.: Наука, 1977, с. 4–5.
- Вангенгейм Э.А., Ербаева М.А., Жегалло В.И., Сотникова М.В.* К палеонтологическому обоснованию стратиграфии антропогена западного Забайкалья. — Изв. АН СССР. Сер. геол., 1975, 10, с. 87–95.
- Василевская Н.Д.* Эоценовая флора Бадхыза и Туркмении. — В кн.: Памяти А.Н. Криштофовича. М.: Изд-во АН СССР, 1957, с. 103–175.
- Васильев В.А.* Стратиграфия четвертичных отложений Таджикистана. — В кн.: Новейший этап геологического развития территории Таджикистана. Душанбе, 1962, с. 5–34.
- Васильковский Н.П.* К характеристике послеолигоценовых дислоцированных отложений Ферганы. — В кн.: Материалы по гидрогеологии Узбекистана. М., 1933, вып. 15, с. 147–155.
- Васильковский Н.П.* Геология гор Супетау, Акбель и Акчоп. — Тр. Тадж. базы АН СССР. Геология и геохимия, 1935, 4, с. 171–204.
- Васильковский Н.П.* Геологическое строение долины р. Ангрэн. Ташкент, 1941. 22 с.
- Васильковский Н.П.* О некоторых генетических типах четвертичных отложений Средней Азии. — Бюл. МОИП. Отд. геол., 1951, 26, № 2, с. 3–24.
- Васильковский Н.П.* К вопросу о происхождении лёсса. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1952, с. 47–62. (Тр. Ин-та геологии АН УзССР; Вып. 8).
- Васильковский Н.П.* К вопросу об условиях образования и возрасте соленосной и гипсоносной свит третичных отложений Северо-Западной Ферганы. — Изв. АН УзССР, 1953, 4, с. 67–73.
- Васильковский Н.П.* К стратиграфии четвертичных отложений Восточного Узбекистана. — Тр. КИЧП, 1957, 13, с. 93–99.
- Васильковский Н.П.* Третичные отложения Северного Таджикистана. — В кн.: Геология СССР. М.: Госгеолтехиздат, 1959, т. 24, ч. 1, с. 290–292.
- Васильчиков М.В., Финкельштейн Ш., Готтлиб А.* и др. Геология и нефтегазоносность Душанбинского прогиба. Душанбе: Ирфон, 1968. 234 с.
- Вертунов Л.Н.* Литология, палеогеография и проблема нефтегазоносности кайнозойских молассовых формаций Иссыккульской впадины. — Науч. тр. Средне-Аз. ун-та. Новая сер., 1972, 431, с. 175–181.
- Винюков В.П.* Олигоцен-нижнемиоценовые и четвертичные отложения полуострова Бузачи с прилегающими к нему площадями. — В кн.: Геология нефтяных и газовых месторождений Урало-Поволжья, Кавказа и Средней Азии. М.: Недра, 1966, с. 316–324.
- Власов Н.Г.* Геология юго-западного Дарваза. — Тр. Ленингр. об-ва естествоиспытателей, 1959, 70, вып. 1, с. 23–28.
- Вонгаз Л.Б.* К стратиграфии и вулканизму меловых и третичных отложений Тоуской депрессии. М.: Госгеолтехиздат, 1956, с. 98–109 (Тр. ВАГТ; Вып. 2).
- Вялов О.С.* Схема деления третичных отложений Ферганы. — Докл. АН СССР, 1935, 2, № 3/4, с. 282–284.
- Вялов О.С.* Опыт комплексного изучения третичных отложений Средней Азии. — В кн.: Тр. Первой Среднеазиатской конф. геологов 1941 г. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1945.
- Вялов О.С.* Олигоцен-нижнемиоценовые отложения Устурта и Северного Приаралья — аналоги майкопской серии. Майкопские отложения Западной Туркмении. — В кн.: Майкопские отложения и их возрастные аналоги на Украине и в Средней Азии. Киев: Наук. думка, с. 147–187, 235–244.
- Габрильян А.М.* Литология, палеогеография и вопросы нефтеносности верхнего мела и палеогена Ферганской депрессии. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1957. 397 с.
- Габуния Л.К.* К истории гиппарионов. М.: Изд-во АН СССР, 1959, 570 с.
- Габуния Л.К.* Беломечетская фауна ископаемых позвоночных. — Тбилиси: Мецниереба, 1973. 138 с.
- Гайдученко Л.Л., Жегалло В.И., Зажигин В.С.* Павлодарское местонахождение гиппарионовой фауны "Усинский перелет": (Автореф. докл.). — Бюл. МОИП. Отд. геол., 1978, 53, вып. 4, с. 147.
- Гарецкий Р.Г., Мерклин Р.Л., Яниши А.Л.* Морские нижнемиоценовые отложения в Приаралье. — Бюл. МОИП. Отд. геол., 1958, 33, № 6, с. 99–108.
- Гарецкий Р.Г., Самодуров В.И., Столяров А.С., Яниши А.Л.* Современное состояние стратиграфии и палеогеографии морского олигоцена и нижнего миоцена Закаспия. — Бюл. МОИП. Отд. геол., 1972, 47, вып. 3, с. 20–34.
- Геккер Р.Ф., Осипова А.И., Бельская Т.Н.* Ферганский залив палеогенового моря Средней Азии. М.: Изд-во АН СССР, 1962, кн. 1. 335 с.
- Година А.Я.* Новые данные о неогеновых жирафах Казахстана и Киргизии. — Бюл. 125

- МОИП. Отд. геол., 1971а, 46, вып. 2, с. 148-149.
- Година А.Я. Новые данные о жирафах рода *Palaeoartagis* из неогеновых отложений Западной Монголии. — В кн.: Фауна мезокайнозоя Западной Монголии. М.: Наука, 1971б, с. 120-123.
- Година А.Я. *Palaeoartagis* из неогеновых отложений Западной Монголии и Средней Азии. — В кн.: Ископаемая фауна и флора Монголии. М.: Наука, 1975, с. 67-75.
- Година А.Я. *Sivatheriinae* (Giraffidae, Artiodactyla) из неогена СССР. — В кн.: Тез. докл. на II Междунар. териол. конгр. М.: Наука, 1978, с. 421.
- Година А.Я., Давид А.И. Неогеновые местонахождения позвоночных на территории Молдавской ССР. Кишинев: Штиинца, 1973. 107 с.
- Година А.Я., Дубинский А.А. Первая находка ископаемой жирафы в Туркмении. — Бюл. МОИП. Отд. геол., 1963, 38(1), с. 155-157.
- Горячев А.В. Мезозойско-кайнозойская структура, история тектонического развития и сейсмичность района озера Иссык-Куль. М.: Изд-во АН СССР, 1959. 179 с.
- Грамм М.Н. Остракоды неогеновых отложений северо-западной Ферганы. — Изв. Узб. фил. АН СССР, 1940, 6, с. 85-88.
- Грамм М.Н. О так называемых неогеновых отложениях Ферганской долины. — Бюл. АН УзССР, 1947, 5, с. 14-17.
- Грамм М.Н. Использование остракод для биостратиграфического расчленения кайнозойских моласс в Ферганской и Таджикской депрессиях. Ташкент, 1949, с. 11-17. (Тр. Ин-та геологии АН УзССР; Вып. 4).
- Грамм М.Н. Некоторые новые данные о третичных красноцветных отложениях юго-западной Ферганы. — Докл. АН УзССР, 1951, 9, с. 23-27.
- Грамм М.Н. О соленосной толще гор Ак-Бель, Кызыл-Джар. — Изв. АН УзССР, 1953, 4, с. 53-66.
- Грамм М.Н. О лицееприловом остракодовом комплексе кепельской (бактрийской) свиты Ферганы. — Докл. АН УзССР, 1959б, 4, с. 19-22.
- Грамм М.Н. Схема деления третичных континентальных отложений Ферганской впадины. — Узб. геол. журн., 1959б, 6, с. 13-22.
- Грамм М.Н. Письмо в редакцию. — Бюл. КИЧП, 1961, 26, с. 173-175.
- Грамм М.Н. Стратиграфия кайнозойских моласс Ферганы и сопоставление их с третичными континентальными отложениями некоторых соседних областей: Автореф. дис. ... д-ра. геол.-минерал. наук. М., 1962, с. 35.
- Грамм М.Н. Неогеновые отложения. — В кн.: Стратиграфия Узбекской ССР. Ташкент: Фан, 1966, т. 2, с. 188-215.
- Грамм М.Н., Гриднев Н.И. Неогеновые отложения (юго-западные отроги Гиссарского хребта и Сурхандарьинская впадина). — В кн.: Стратиграфия Узбекской ССР. Ташкент: Фан, 1966, т. 2, с. 216-224.
- Грамм М.Н., Корсаков Ф.П. К стратиграфии третичных континентальных отложений Кашка-Дарьинской области. — Изв. АН УзССР, 1952, 2, с. 45-50.
- Грамм М.Н., Осипова Г.А. О свите "Д" на Чуст-Палской антиклинали. — Докл. АН УзССР, 1952, 11, с. 14-16.
- Гриднев Н.И. Литология и палеогеография кайнозойских моласс Ферганской депрессии. Ташкент: Фан, 1971. 266 с.
- Гриднев Н.И., Хаджиматов А.Х. Об осадках, залегающих под соленосной свитой гор Ак-Бель, Кызыл-Джар. — Узб. геол. журн., 1958, 6, с. 59-62.
- Громов В.И., Алексеев М.Н., Вангенгейм Э.А. и др. Схема корреляции антропогенных отложений Северной Евразии. — В кн.: Корреляция антропогенных отложений Северной Евразии. М.: Наука, 1965, с. 5-33.
- Громов В.И., Вангенгейм Э.А., Никифорова К.В. Биостратиграфическое обоснование нижней границы и подразделения антропогенной системы. — В кн.: Проблемы стратиграфии кайнозоя. М.: Недра, 1965, с. 100-118.
- Громов В.И., Краснов И.И., Никифорова К.В., Шанцер Е.В. Схема подразделения антропогена. — Бюл. КИЧП, 1969, 36, с. 41-55.
- Громов В.И., Никифорова К.В. Граница между неогеном и антропогеном (четвертичным периодом). — В кн.: Граница третичного и четвертичного периодов. М.: Наука, 1968, с. 9-16.
- Громова В.И. Краткий обзор четвертичных млекопитающих Европы. М.: Наука, 1965. 143 с.
- Губин И.Е. Геолого-поисковый отряд № 13. — В кн.: Таджикско-Памирская экспедиция АН СССР 1933 г. М.; Л.: Изд-во АН СССР, с. 261-270.
- Губин И.Е. Геолого-тектонический очерк Гармского района. — Тр. Геофиз. ин-та АН СССР, 1949, 8(135), с. 72-94.
- Губин И.Е. Закономерности сейсмических проявлений на территории Таджикистана. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 464 с.
- Гуреев А.А. Первая находка птицы в нижнем палеогене СССР. — Докл. АН СССР, 64, № 2, 1949, с. 249-251.
- Гусев И.А., Пенькова А.М., Дронов В.И. Новые данные о красноцветных отложениях долин рек Аксу, Восточной и Западной Пшарты (Восточный Памир). — Докл. АН ТаджССР, 1972, 15, № 7, с. 45-48.
- Давыденко А.М. К вопросу о климате и растительности восточной части Таджикской депрессии в неогеновое время. — Учен. зап. Тадж. ун-та, 1962, 1, с. 112-118.
- Данчев В.И. Цвет осадочных пород и причины, его определяющие. — В кн.: Методы изучения осадочных пород. М.: Госгеолтехиздат, 1957, т. 1, с. 51-55.
- Дарвин Ч. Путешествие натуралиста вокруг света на корабле "Бигль". М.: Географгиз, 1953. 582 с.
- Девяткин Е.В. Геология кайнозоя Западной Монголии. — В кн.: Геология мезозоя и кайнозоя Западной Монголии. М.: Наука, 1970, с. 37-43.
- Демек Я. Теория систем и изуч. ландшафта. М.: Прогресс, 1977. 223 с.
- Диденко-Кислицына Л.К. От р. Или до района пос. Коктал. — В кн.: Путеводитель по геологическим маршрутам Южного Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1961, с. 56-59.
- Дмитриев А.В. Стратиграфия и устрицы палеогеновых отложений южных районов Туркменистана: Автореф. ... дис. канд. геол.-минерал. наук. Ашхабад, 1965. 23 с.
- Дмитриев А.В., Джабарова В.В., Коженикова Г.Е. и др. Схема стратиграфии палеогеновых отложений Туркмени. — В кн.: Геология и полезные ископаемые Туркмени: Стратиграфия. Ашхабад, 1969, с. 156-178.
- Дмитриева Е.Л. *Gazella dorcadoides* Schlosser на территории МНР и сопредельных стран. — В кн.: Фауна и биостратиграфия мезозоя и кайнозоя Монголии. М.: Наука, 1974, с. 91-97.
- Дмитриева Е.Л. Ископаемые и винторогие антилопы Западной Монголии и некоторых районов Средней Азии. — В кн.: Фауна и биостратиграфия мезозоя и кайнозоя Монголии. М.: Наука, 1975, с. 76-83.
- Дмитриева Е.Л. Антилопы неогена Монголии и сопредельных территорий. М.: Наука, 1977. 120 с.
- Додонов А.Е. О верхнеплиоцен-нижнеплейстоценовых отложениях восточной части Таджикской депрессии (бассейны рек Кызылсу и Яксу). — В кн.: Стратиграфия, палеогеография и литогенез антропогена Евразии. М.: ВИЭМС, 1973, с. 103-117.
- Додонов А.Е., Пеньков А.В. Некоторые данные по стратиграфии водораздельных лесов Таджикской депрессии (Южный Таджикистан). — Бюл. КИЧП, 1977а, 47, с. 67-76.
- Додонов А.Е., Пеньков А.В. Верхний плиоцен. — В кн.: Путеводитель экскурсий: Междунар. симпозиум по пробл. "Граница неогена и четвертичной системы". М.: Наука, 1977б, с. 9-10.
- Додонов А.Е., Рапов В.А. Новые палеолитические находки в лесах бассейна р. Кызылсу (Южный Таджикистан). — Бюл. КИЧП, 1976, 46, с. 99-106.
- Додонов А.Е., Сотникова М.В. О тафономии местонахождений верхнеплиоцен-эоплейстоценовых остатков млекопитающих в Южном Таджикистане. — В кн.: Палеонтологическое обоснование стратиграфии антропогена. М., изд. ГИН АН СССР, 1977, с. 95-101.
- Дуброво И.А. Новые данные о позднекайнозойских млекопитающих Таджикистана. — Палеонтол. журн., 1963, 2, с. 155.
- Дуброво И.А. Слоны рода *Archidiskodon* на территории СССР. — Палеонтол. журн., 1964, 4, с. 82-94.
- Дуброво И.А. Новые данные о миоценовых мастодонтах Внутренней Монголии. — В кн.: Материалы по эволюции наземных позвоночных. М.: Наука, 1970, с. 135-140.
- Дуброво И.А., Капеллист К.В. Каталог местонахождений третичных позвоночных УССР. М.: Наука, 1979. 159 с. (Тр. ПИН АН СССР; Т. 177).
- Дуброво И.А. Новые данные об ископаемых даманах. — Палеонтол. журн., 1978, 3, с. 97-106.
- Екшибаров С.В. Тектоника и некоторые вопросы нефтегазоносности мезозойских отложений юго-западного окончания Гиссарской мегантиклинали и восточной части Кашкадарьинской впадины. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1962. 127 с.
- Елисеев В.И. Кайнозойские аллювиальные отложения северо-восточной окраины Чуйской впадины. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 191 с. (Тр. ГИН АН СССР; Вып. 156).
- Ерофеев В.С. Геологическая история южной периферии Алтая в палеогене и неогене. Алма-Ата: Наука, 1969. 166 с.
- Ефремов И.А. Динозавровый горизонт Средней Азии и некоторые вопросы стратиграфии. — Изв. АН СССР. Сер. геол., 1944, 3, с. 40-58.
- Ефремов И.А. Тафономия и геологическая летопись. М.: Изд-во АН СССР. 179 с. (Тр. ПИН АН СССР; т. 24).
- Жегалло В.И. Изучение местонахождения гиппарионовой фауны Орток (Киргизская ССР). — Бюл. МОИП. Отд. геол., 1961, 36, вып. 6, с. 119-120.
- Жегалло В.И. Гиппарионы Центральной Азии. М.: Наука, 1978. 151 с. (Тр. ПИН АН СССР; Вып. 7).
- Жегалло В.И., Борисов В.А. Палеонтологические исследования в Зайсанской впадине. — Бюл. МОИП. Отд. геол., 1968, 1, с. 152.
- Животовская А.И. Плиоцен Северных Каракумов Туркмении и его связь с плиоценом Западного Узбекистана. — В кн.: Геология и полезные ископаемые Туркмении: Стратиграфия. Ашхабад, 1969, с. 246-272.
- Животовская А.И., Данилов В.Г. Атлас тектур неогеновых пород Западного Узбекистана. Л.: Недра, 1969. 211 с.
- Жижченко Б.П., Колесникова В.П., Эберзин А.Г. Неоген СССР. — В кн.: Стратиграфия СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940, т. 12. 687 с.
- Жижченко Б.П. Методы стратиграфических исследований нефтегазоносных областей. М.: Недра, 1969. 373 с.
- Жинью М. Стратиграфическая геология. М.: Изд-во иностр. лит., 1952. 638 с.
- Жуков Ю.В. О находке остатков млекопитающих в контурпакской свите хребта Кунгей Алатау. — В кн.: Материалы по зоологии кайнозоя и новейшей тектонике Тянь-Шаня. Фрунзе: Илим, 1970, с. 69-71.
- Жылкибаев К.Ж. Ископаемые остатки слонов в коллекциях Института зоологии АН КазССР. — В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1963, т. 4, с. 66-76.
- Жылкибаев К.Ж. Древние слоны Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1975. 132 с.
- Зажигин В.С. Стратиграфическое значение фауны мелких млекопитающих эоплейстоцена Западной Сибири. — Бюл. КИЧП, 1966, 32, с. 46-50.
- Зайцев Н.С. О возрасте красноцветных третичных толщ южной части Тургайской впадины. — Изв. АН СССР. Сер. геол., 1939, 3, с. 63-83.

- Зайцев Н.С., Петрушевский Б.А.* Геологические исследования в южной части Тургайской впадины. М.: Изд-во АН СССР, 1950, с. 66–110. (Тр. ИГН АН СССР. Сер. геол.; Вып. 108, № 36).
- Запрудская М.А., Хутров А.М.* Нефтяные месторождения. Разведочные площади. — В кн.: Геологическое строение и нефтегазосность Ферганы. Л.: Госгостехиздат, 1957, с. 298–398.
- Зеленова О.И.* К геохимическим особенностям палеогеновой эпохи Таджикской депрессии. — *Вопр. географии*, 1962, 59, с. 164–171.
- Зинова Р.А.* Стратиграфия средне-верхнеплиоценовых отложений Центрального Казахстана. — *Сов. геология*, 1973, 2, с. 59–70.
- Зоогеография палеогена Азии. М.: Наука, 1974, 302 с.
- Зхус И.Д.* Глинистые минералы и их палеогеографическое значение. М.: Наука, 1966, 279 с.
- Ибрагимов И.М., Талипов М.А.* К вопросу о стратиграфии кайнозойских отложений Иссыккульской впадины. — В кн.: Новые данные по стратиграфии Тянь-Шаня. Фрунзе: Илим, 1965, с. 188–199.
- Ибрагимов А.Х., Турдукулов А.Т.* К стратиграфии третичных (палеоген-неогеновых) континентальных отложений Чуйской впадины. — В кн.: Новые данные по стратиграфии Тянь-Шаня. Фрунзе: Илим, 1965, с. 173–187.
- Ибрагимов А.Х., Турдукулов А.Т.* Третичные отложения межгорных впадин Тянь-Шаня в северной части Киргизской ССР. — В кн.: Стратиграфия кайнозой и некоторые вопросы новейшей тектоники Северной Киргизии. Фрунзе: Илим, 1966, с. 37–68.
- Иванов Е.В.* Гидрогеологические исследования в северной части Ташкентского узезда в 1923 г. — *Вестн. ирригации*, 1926, 4, с. 65–104.
- Иванов Е.В.* Ташкент — Угам — Чимкент. — В кн.: Путеводитель экскурсий III Всесоюз. съезда геологов в Ташкенте. Л.: Геол. ком., 1928, с. 1–19.
- Иванова В.А.* О зональном расчленении майкопских отложений Южного Приаралья по фораминиферам. М.: Недра, 1961, с. 83–98. (Тр. Союз. геол.-поиск. конторы Главгаза при Совете Министров СССР; № 2).
- Иванова В.А.* Стратиграфия майкопских отложений Южного Приаралья по фораминиферам. — В кн.: Майкопские отложения и их возрастные аналоги на Украине и в Средней Азии. Киев: Наук. думка, 1964, с. 232–234.
- Ильина А.П.* Моллюски палеогена Северного Устьурта. М.: Госгеолгиздат, 1955, 90 с. (Тр. ВНИГРИ. Новая сер.; Вып. 89).
- Ильина А.П.* Биостратиграфический очерк палеогена Мангышлака. М.: Госгеолгиздат, 1963, с. 380–393. (Тр. ВНИГРИ. Новая сер.; Вып. 218).
- Ильина А.П., Уткин В.С.* Неогеновые отложения Мангышлака. М.: Госгеолгиздат, 1963, с. 415–424. (Тр. ВНИГРИ. Новая сер.; Вып. 218).
- Калесник С.В.* Общие географические закономерности Земли. М.: Мысль, 1970, 283 с.
- Калицкий К.П.* Нефтяные месторождения Шорсу и Камыш-Баши. М., 1915, 35 с. (Тр. Геол. ком. Новая сер.; Т. 133).
- Камбаридинов Р.К.* О сопоставлении фаунистических комплексов Средней Азии с местными стратиграфическими схемами антропогенных отложений. — *Узб. геол. журн.*, 1968, 3, с. 69–73.
- Камбаридинов Р.К., Камбаридинова Т.К.* О фауне и стратиграфии кайнозойских моласс Приташкентского района. — *Узб. геол. журн.*, 1969, 6, с. 25–28.
- Камбаридинов Р.К., Худайбердыев Т.Н.* Плиоценовая фауна Приташкентского района. — В кн.: Экология и биология животных Узбекистана. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1972, с. 298–300.
- Камбаридинова Т.К., Камбаридинов Р.К.* О нижней границе антропогена и стратиграфии лесовых пород Средней Азии с фаунистическим обоснованием. — В кн.: Тр. Междунар. симпоз. по литологии и генезису лесовых пород. Ташкент: Фан, 1970, т. 1, с. 224–232.
- Карась О.И., Королева Н.П., Толстикова И.В.* Стратиграфическое значение неогеновых моллюсков Нарынской впадины. — В кн.: Вопросы стратиграфии и палеонтологии. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1976, вып. 2, с. 117–137.
- Кассин Н.Г.* Материалы по палеогеографии Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1947, 258 с.
- Кассин Н.Г., Грюше П.А., Ершов С.П.* и др. Гидрогеологические исследования, проведенные в бассейне озера Иссык-Куль (Семиреченская область, Пржевальский уезд) в 1914 г. Пг., 1915, 268 с.
- Казанова Л.П., Коробков А.И.* Возраст морских красноцветных кайнозойских отложений и подстилающих зеленых глин Центральных и Юго-Западных Кызылкумов. Л.: Недра, 1969, с. 53–61. (Тр. ВСЕГЕИ. Новая сер.; Т. 130. Вып. 4).
- Кириков А.П.* О континентальных отложениях Семиречья. — *Изв. Геол. ком.*, 1927, 46, № 5, с. 453–462.
- Кирюхин Л.Г., Клейнер Ю.М., Хондакарян С.О.* Новейшие отложения Восточного Приаралья и их связь с тектоническим строением. — *Сов. геология*, 1966, 11, с. 113–116.
- Клебанова И.М.* Новое эоценовое местонахождение позвоночных Андарак (Киргизия). — *Палеонтол. журн.*, 1966, 4, с. 101–103.
- Клейнберг В.Г.* О возрасте третичных красноцветов Ферганы. М.: Госгостехиздат, 1953, с. 320–336. (Тр. ВНИГРИ. Новая сер.; Вып. 110).
- Клейнберг В.Г.* Третичная система. М.: Госгеолгиздат, 1957, с. 117–182. (Тр. ВНИГРИ, Вып. 110).
- Клейнберг В.Г., Симakov С.Н.* Тектоника. — В кн.: Геологическое строение и нефтеосность Ферганы. Л.: Госгостехиздат, 1957, с. 209–276. (Тр. ВНИГРИ; Вып. 110).
- Клуников С.И.* Геологические исследования в Маглан-Фарабском районе летом 1930 г. — *Изв. ВГРО*, 1931, 50, вып. 68, с. 1–14.
- Ковалев В.С.* К палеогеографии Восточного Приаралья в акачагыльский век. — В кн.: Геология, стратиграфия и сейсмология Узбекистана. Ташкент: Наука, 1966, с. 34–40.
- Коган Н.А., Ранов В.А., Скворцов Ю.А., Телухин Г.Ф.* Четвертичная система. — В кн.: Геология СССР. М.: Недра, 1972, т. 23, кн. 1, с. 678–716.
- Кожамкулова Б.С.* Остатки ископаемых антропогенных позвоночных. — В кн.: Путеводитель по геологическим маршрутам Южного Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1961, с. 80–86.
- Кожамкулова Б.С.* Антропогенная ископаемая териофауна Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1969, 150 с.
- Кожамкулова Б.С.* Итоги исследований ископаемой териофауны южной половины Казахстана. — В кн.: Фауна и флора из мезокайнозой Южного Казахстана: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана: Алма-Ата: Наука, 1974, т. 6, с. 5–10.
- Кожамкулова Б.С.* Зоогеографический анализ состава и распределения антропогенной фауны Казахстана в пространстве и времени. — В кн.: Мезо-кайнозойская фауна и флора Северо-Западного Казахстана: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1977, т. 7, с. 89–104.
- Кожевников А.В.* Зоплейстоцен Поволжья и предгорий Кавказа. — В кн.: Проблемы геологии и палеогеографии антропогена. М.: Изд-во МГУ, 1966, с. 50–107.
- Копп М.Л., Расцветов Л.М.* О расчленении "надакчагыльских конгломератов" Западного Колеп-Лага. — *Вестн. МГУ. Сер. 4, Геология*, 1969, 3, с. 80–87.
- Корнилова В.С.* Растительные остатки из неогеновых отложений Кунгей Алатау. — В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1961, т. 3, с. 74–93.
- Корнилова В.С.* Об антропогенных флорах Средней Азии. — В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1963, т. 4, с. 113–151.
- Корнилова В.С.* Очерк истории флоры и растительности Казахстана. — В кн.: Растительный покров Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1966а, с. 37–190.
- Корнилова В.С.* Региональные особенности миоценовых флор Северного Тянь-Шаня и их место в синхронных флорах Евразии. — В кн.: Стратиграфия кайнозой и некоторые вопросы новейшей тектоники Северной Киргизии. Фрунзе: Илим, 1966б, с. 109–120.
- Коробков И.А.* Новые данные о фаунистической характеристике и возрасте ашеайрыкской свиты Северного Устьурта. — *Докл. АН СССР*, 1962, 144, № 2, с. 417–419.
- Коробков И.А.* Состояние изученности палеогеновых отложений СССР и задачи дальнейших исследований. Л.: Недра, 1964, с. 41–79. (Тр. ВСЕГЕИ, Нов. сер.; Т. 102).
- Коробков И.А., Коробков А.И.* К проблеме ярусного деления олигоцена. — *Изв. АН АрмССР*, 1965, 5, с. 3–14.
- Коробков И.А., Макарова Р.К.* Новые данные о пограничных горизонтах между эоценовыми и олигоценовыми отложениями в Южном Приаралье. — *Докл. АН СССР*, 1960, 134, № 4, с. 902–904.
- Коробков И.А., Макарова Р.К.* Стратиграфия и фаунистическая характеристика палеогеновых отложений Кызылкумов и Южного Приаралья. Л.: Госгостехиздат, 1964, с. 236–254. (Тр. ВСЕГЕИ. Новая сер.; Т. 102).
- Коровин Е.П.* Растительность Средней Азии и Южного Казахстана. М.: Изд-во АН СССР, 1961, кн. 1, 452 с.
- Корсаков Ф.П.* Литолого-стратиграфический очерк Шурусанского разреза кайнозойских моласс. Ереван, 1956, с. 75–92. (Науч. тр. Среднеаз. гос. ун-та; Вып. 82).
- Корсаков Ф.П.* К стратиграфии неогена Приташкентского района. Ташкент, 1963, с. 61–69. (Науч. тр. Среднеаз. ун-та; Вып. 220).
- Корсаков Ф.П.* К стратиграфии неогена Ангреской долины. Ташкент, 1964, с. 192–198. (Науч. тр. Среднеаз. гос. ун-та; Вып. 249).
- Корсаков Ф.П.* История тектонического развития Приташкентского района в олигоцене и неогене. — В кн.: К геохимии и литологии Средней Азии. Ташкент, 1965, с. 88–94.
- Корсаков Ф.П.* Приташкентский район: (Неогеновая система). — В кн.: Геология СССР. М.: Недра, 1972, т. 23, ч. 1, с. 665–678.
- Костенко Н.И.* Континентальные кайнозойские отложения Южного Казахстана. Ташкент, 1964а, с. 164–184. (Научн. тр. Среднеаз. гос. ун-та; Вып. 249).
- Костенко Н.И.* Стратиграфия кайнозой Юго-Восточного Казахстана. — *Изв. АН КазССР. Сер. геол.*, 1964б, с. 3–17.
- Костенко Н.И.* Неогеновая система: (Введение). — В кн.: Геология СССР. М.: Недра, 1971, т. 40, ч. 1, с. 456–458.
- Костенко Н.И., Бириков М.Д., Лычев Г.Ф., Савинов П.Ф.* Олигоценые континентальные отложения Южного Казахстана. — В кн.: Проблемы геологии и гидрогеологии Казахстана. Алма-Ата, 1977, вып. 7, с. 101–123.
- Костенко Н.И., Кожамкулова Б.С.* Палеонтологические критерии в корреляции нижнеантропогенных отложений Казахстана и Таджикистана. — *Вестн. АН КазССР*, 1964, 6 (231), с. 89–91.
- Костенко Н.И., Никитин Е.А., Ляжжина К.А.* Бетпак-Дала, Чуйская впадина, хребты Каратау, Киргизский, Кендыктас, и Чубалхашский водораздел: (Палеогеновая система). — В кн.: Геология СССР. М.: Недра, 1971, т. 40, ч. 1, с. 436–444.
- Костенко Н.И., Никитин Е.А., Савинова А.П.* Бетпак-Дала, Чуйская впадина, хребты Каратау, Киргизский, Кендыктас, и Чубалхашский водораздел: (Неогеновая система).

- тема). — В кн.: Геология СССР. М.: Недра, 1971, т. 40, ч. 1, с. 468—471.
- Костенко Н.Н., Попов В.И., Теленков А.С.** Схема стратиграфии неогеновых отложений территории республик Средней Азии и Южного Казахстана. — В кн.: К геохимии и литологии Средней Азии. Ташкент, 1965, с. 27—30.
- Костенко Н.Н., Савинова А.П.** Восточные Кызылкумы, Большая Каратау, отроги Таласского Алатау (Неогеновая система). — В кн.: Геология СССР. М.: Недра, 1971, т. 40, ч. 1, с. 458—464.
- Костенко Н.Н., Сотникова М.А.** Палеогеография предгорий Зайлижского Алатау в неогене и антропогене по данным палинологии. — В кн.: Геология. Алма-Ата, 1973, вып. 8, с. 22—28.
- Костенко Н.П.** Геоморфологический анализ речных долин горных стран (на примере Куххистана). — Бюл. КИЧП, 1958, 22, с. 73—90.
- Костенко Н.П.** Парагенетические комплексы четвертичных отложений горных стран Средней Азии. Лёссовидные породы горных стран юга Средней Азии. — В кн.: Новейший этап геологического развития территории Таджикистана. Душанбе, 1962, с. 69—91, 119—141.
- Костенко Н.П., Макаров В.И., Соловьева Л.И.** Новейшая тектоника. — В кн.: Геология СССР. М.: Недра, 1972, т. 25, кн. 2, с. 249—271.
- Костенко Н.П., Несмеянов С.А., Ранов В.А.** О находке палеолитических орудий на возвышенности Ак-Джар. — Докл. АН ТаджССР, 1961, 4, № 6, с. 29—34.
- Крейденов Г.П.** История геологического развития юго-восточных районов Средней Азии в палеогеновый период на основе детальной стратиграфии: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. Л.; 1968. 18 с.
- Крейденов Г.П.** Палеогеновые отложения Зеравшанского и Туркестанского хребтов. — В кн.: Новые данные по геологии Таджикистана. Душанбе, 1971, с. 134—149.
- Крейденов Г.П., Давидзон Р.М.** К стратиграфии верхнеэоценовых и олигоценовых отложений Таджикской депрессии. — Сов. геология, 1966, 11, с. 78—91.
- Кришнам М.С.** Геология Индии и Бирмы. М.: Изд-во иностр. лит., 1954. 424 с.
- Криштофович А.Н.** Материалы к третичной верхнемеловой флоре Средней Азии. — Ботан. журн., 1941, 26, № 2/3, с. 110—114.
- Криштофович А.Н.** Эволюция растительного покрова в геологическом прошлом и ее основные факторы. — В кн.: Материалы по истории флоры и растительности СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1946, т. 2, с. 21—86.
- Криштофович А.Н.** Развитие ботанико-географических областей северного полушария с начала третичного периода. — В кн.: Вопросы геологии Азии. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955, т. 2, с. 824—844.
- Криштофович А.Н.** Палеоботаника. Л.: Госгеолтехиздат, 1957. 650 с.
- Крылов А.Я.** Абсолютный возраст пород Центрального Тянь-Шаня и применение аргонного метода к метаморфическим и осадочным породам. — В кн.: Докл. сов. геологов на XXI сессии МГК. Пробл. 3. М.: Изд-во АН СССР, 1960, с. 222—244.
- Куряцев Н.А.** Геологические исследования в районе Шур-Гасанского нефтяного месторождения (Узбекистан). М.; Л.: ОНТИ, 1932а. 27 с. (Тр. Нефт. геол.-разв. ин-та. Сер. А; Вып. 21).
- Куряцев Н.А.** Геологическое строение южного склона Гиссарского хребта в районе горы Каратаг. М.; Л.: ОНТИ, 1932б. 52 с. (Тр. Нефт. геол.-разв. ин-та, сер. А; вып. 23).
- Кузнецов В.В.** О времени появления черепашьих Хорсфильда в Средней Азии. — В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1963, т. 4, с. 217—218.
- Кузнецов В.Д., Карабаев К.К., Ибрагимов И.М.** Ископаемая черепаша из Киргизии. — В кн.: Материалы по геологии Тянь-Шаня. Фрунзе: Изд-во АН КиргССР, вып. 4, с. 135—146.
- Куликов О.А.** Корреляция новейших отложений и этапов палеогеографического развития Алтая и Тянь-Шаня на основе палеомагнитных данных: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. М., 1974. 16 с.
- Курдюков К.В.** Схема расчленения четвертичных (антропогенных) отложений Северной Киргизии. — Докл. АН СССР, 1962, 142, № 1, с. 159—162.
- Кутузкина Е.Ф.** К третичной флоре юго-западного Тянь-Шаня. — Ботан. журн., 1954, 39, № 2, с. 195—201.
- Кутузкина Е.Ф.** Материалы по верхнетретичной флоре Киргизии. — В кн.: Сборник памяти А.Н. Криштофовича. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957, с. 259—275.
- Кушнарв С.А.** Предгорья Северной Ферганы. — В кн.: Геология Узбекской ССР. Ташкент, 1937, т. 1, с. 361—389.
- Лавров В.В.** Континентальный палеоген и неоген Арало-Сибирских равнин. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1959. 231 с.
- Лаврушин Ю.А.** Биткейские слои Северного Казахстана и их вероятные аналоги: Тез. докл. Всесоюз. совещ. по изуч. четвертичного периода. Секция стратиграфии. Новосибирск, 1964, с. 41—42.
- Лозиев В.П.** Об антропогенных отложениях в междуречье Вахша и Кафирнигана. — В кн.: Проблемы нефтегазоносности Таджикистана. Душанбе, 1972, с. 123—131. (Тр. Тадж. отд-ния ВНИГНИ; Вып. 133, № 4).
- Лозиев В.П., Лим С.С.** О находке окаменелой ильшского фаунистического комплекса в северо-восточной части междуречья Кафирнигана и Иляка. — Докл. АН ТаджССР, 1962, 5, № 5, с. 39—40.
- Лоскутов В.В.** О скорости новейшего поднятия Памира. — В кн.: Неотектоника и сейсмоструктура Таджикистана. Душанбе: Донш, 1969, с. 35—42.
- Лоскутов В.В., Ершова Л.Н., Колотов В.А., Лим В.В.** О стратиграфии верхнеплиоцен-четвертичных отложений Таджикской депрессии. — Изв. АН ТаджССР. Отд-ние физ.-мат. и геол.-хим. наук, 1971, 2(40), с. 91—101.
- Лоскутов В.В., Меламед Я.Р., Рафиев А.** и др. О возрасте кулябской явты Таджикской депрессии. — Докл. АН ТаджССР, 1965, 8, № 4, с. 28—30.
- Лузин Б.К., Расцветов Л.М.** Методика корреляции элементов рельефа и неоген-антропогенных моласс на примере Центрального Колет-Дага. — Изв. вузов. Геология и разведка, 1966, 5, с. 33—40.
- Лычев Г.Ф., Савинов П.Ф.** Позднеплиоценовые зайцеобразные и грызуны Киикбая. — В кн.: Фауна и флора из мезокайнозойского Южного Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1974, с. 39—56.
- Ляджина К.А., Мартынова М.Я.** Зональное расчленение морского зоэона Южного Казахстана (по моллюскам и фораминиферам). — В кн.: Геология. Алма-Ата, 1969, вып. 5, с. 25—29.
- Мавлянов Г.А., Исламов А.И.** Четвертичные отложения Узбекистана. — В кн.: Проблемы геологии и полезных ископаемых Узбекистана. Ташкент: Наука, 1964, с. 54—72.
- Мадери У.Н.** Состояние изученности палеогеновых и неогеновых первичных моллюсков Казахстана и Западной Сибири. — В кн.: Стратиграфия и палеонтология мезозойских и палеоген-неогеновых континентальных отложений Азиатской части СССР. Л.: Наука, 1967, с. 219—226.
- Макарова Л.А.** Первые находки остатков лошади Стенона в Казахстане. — В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1965, т. 1, с. 29—39.
- Макарова Р.К., Миронов Л.В.** О сопоставлении морских палеогеновых отложений Тургая, Приаралья и Средней Азии. Л.: Недра, 1964, с. 203—217. (Тр. ВСЕГЕИ. Новая сер.; Т. 102).
- Макарова Р.К., Черкашенко Н.В.** Новые данные по стратиграфии палеогеновых отложений бассейна р. Ангрэн. — В кн.: Палеонтологическое обоснование стратиграфии мезозойских и кайнозойских отложений Узбекистана. Ташкент: Фан, 1969, вып. 8, с. 151—160.
- Малега А.М.** Эоценовое местонахождение остатков млекопитающих Кызылнура (Чаткальский хребет). — Узб. геологический журнал, 1972, 3, с. 66—67.
- Мамедов Э.Д.** К стратиграфии новейших континентальных образований центральных Кызылкумов. Ташкент, 1957, с. 103—116. (Тр. Среднеаз. ун-та; Вып. 99. Кн. 10).
- Мандельштам М.И., Шнейдер Г.Ф.** Ископаемые остракоды СССР: Семейство Sargidae. Л.: Госонтехиздат, 1963. 331 с. (Тр. ВНИГРИ; Вып. 203).
- Марковский А.П.** Основные черты геологического строения средней части Центрального Таджикистана. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1934, с. 1—48. (Тр. Тадж. комплексн. экспедиции 1932 г.; Вып. 4).
- Марковский А.П.** Зеравшано-Гиссарская горная область. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937, с. 743—776. (Тр. Тадж.-Памир. экспедиции 1935 г.).
- Марковский А.П.** Северо-западные предгорья Туркестанского хребта. — В кн.: Геология Узбекской ССР. Ташкент, 1937, т. 1, с. 429—448.
- Мартынов А.В.** Местонахождения ископаемых насекомых в пределах СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1938, с. 7—28. (Тр. ПИН АН СССР; Т. 7. Вып. 3).
- Меламед Я.Р.** Основные закономерности геологического и палеогеографического развития Таджикской депрессии в неогеновом периоде. — В кн.: Вопросы геологического строения и перспективы нефтегазоносности Таджикистана. Душанбе, 1965, вып. 1, с. 75—82.
- Меламед Я.Р.** Типы разрезов и стратиграфии неогеновых отложений Южного Таджикистана. — Изв. вузов. Геология и разведка, 1966, 5, с. 10—19.
- Менесье Г.** Стратиграфический справочник: Афганистан. М.: Изд-во иностр. лит., 1963. 176 с.
- Меннер В.В.** К унификации стратиграфии кайнозой. — В кн.: Пробл. геологии на 22 сессии МГК. М.: Наука, 1966, с. 78—85.
- Меннер В.В., Невеская Л.А., Габуния Л.К., Носовский М.Ф.** Проблемы стратиграфии неогена Средиземноморья. — Бюл. МОИП. Отд. геол., 1976, 12(5), с. 8—19.
- Мерклин Р.Л.** Горизонты средне- и верхнеолигоценовых отложений юга СССР. Докл. АН СССР, 1962, 144, № 2, с. 420—423.
- Мерклин Р.Л., Столяров А.С.** О соленомском горизонте Западного Колет-Дага. — Бюл. МОИП. Отд. геол., 1962, 37, № 5, с. 61—68.
- Милло Ш.** Геология глин. Л.: Недра, 1968. 359 с.
- Минакова Н.Е.** К стратиграфии верхнеэоценовых и олигоценовых отложений Кызылкумов. Л.: Недра, 1964, с. 218—235. (Тр. ВСЕГЕИ. Новая сер.; Т. 102).
- Минакова Н.Е.** Палеогеновые отложения. — В кн.: Стратиграфия Узбекской ССР. Ташкент: Фан, 1966, кн. 2, с. 127—187.
- Минина Е.А.** Кулябский комплекс Таджикской депрессии. — В кн.: Хронология плейстоцена и климатическая стратиграфия. Л.: Изд-во Геогр. о-ва, 1973, с. 229—239.
- Мирзод С.Х., Колчанов В.П., Манучарянц О.А.** Афганистан: (краткие сведения о геологическом строении и полезных ископаемых). — Бюл. МОИП. Отд. геол., 1968, 93, вып. 1, с. 31—52.
- Мисников К.П.** К стратиграфии неогеновых конгломератов Исфаринского района. — Докл. АН ТаджССР, 1952, 4, с. 13—17.
- Мордвилко Т.А.** К вопросу о параллелизации третичных отложений Каратау со смежными районами Средней Азии и Казахстана. — Пробл. сов. геологии, 1936, 12, с. 1057—1066.
- Мурти Докка А.Н., Попов В.И., Корсаков Ф.П.** Сравнительная характеристика сиваликских и среднеазиатских молассовых формаций. Ташкент, 1967, с. 39—57. (Науч. тр. Ташк. ун-та; Вып. 326).
- Мусакулова Л.Т.** Позднемиоценовая газель из Тянь-Шаня. — В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана

- Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1963, т. 4, с. 204–206.
- Мусакулова-Абдрахманова Л.Т.* Представитель жвачных (*Lagotegux satensis* sp. nov.). – В кн.: Терпология. Новосибирск: Наука, 1972, т. 1, с. 155–159.
- Мухамеджанов А.Р., Камбариддинов Р.К.* Редкие находки древнейших жвачных Узбекистана. – В кн.: История материальной культуры Узбекистана. Ташкент: Фан, 1969, вып. 8, с. 52–55.
- Мушкетов Д.И.* Из Пржевальска в Фергану. – Изв. Геол. Ком., 1912, 31, с. 441–470.
- Надыршин Р.И.* К стратиграфии олигоцена предгорий юго-западных отрогов Гиссара и прилегающих равнин. – В кн.: Сборник научных трудов АН УзССР. Ташкент, 1964, вып. 3, с. 131–133.
- Надыршин Р.И., Алфиров Г.Ю.* Юго-западные отроги Гиссарского хребта и Сухандарьинская впадина: Неогеновая система. – В кн.: Геология СССР. М.: Недра, 1972, т. 23, кн. 1, с. 643–648.
- Наливкин Д.В.* Учение о фашиях. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956, т. 1, 543 с.
- Невеская Л.А., Богданович А.К., Власов О.С.* и др. Ярусная шкала неогеновых отложений юга СССР. – Изв. АН СССР. Сер. геол., 1975, 2, с. 104–120.
- Нейман-Пермякова О.Ф.* Акбель и Акчоп. – Изв. Геол. Ком., 1929, 18, № 5, с. 35–59.
- Неймышев М.В.* Стратиграфия неогеновых отложений Кочкорской впадины в свете новых палеонтологических данных. – В кн.: Новые данные по стратиграфии Тянь-Шаня. Фрунзе: Илим, 1965, с. 167–172.
- Неронова Л.В.* Краснодарский полуостров и Большой Балхан: (Морские верхнеплиоценовые отложения). – В кн.: Геология СССР. М.: Госгеолтехиздат, 1957, т. 22, кн. 1, с. 265–271.
- Несмеянов С.А.* О новой находке южного слона в молассах Северо-Западной Ферганы. – Докл. АН ТаджССР, 1964, 7, № 5, с. 36–38.
- Несмеянов С.А.* О методах стратификации континентальных моласс. – В кн.: Жизнь Земли. М.: Изд-во МГУ, 1965а, № 3, с. 157–166.
- Несмеянов С.А.* К стратиграфии кайнозойских моласс Западной Ферганы. – В кн.: К геохимии и литологии Средней Азии. Ташкент, 1965б, с. 101–104.
- Несмеянов С.А.* К вопросу о стратиграфических схемах четвертичных отложений Западного Тянь-Шаня. – Бюл. КИЧП, 1965в, 30, с. 136–144.
- Несмеянов С.А.* О стратиграфической схеме континентальных четвертичных отложений Средней Азии. – В кн.: Жизнь Земли. М.: Изд-во МГУ, 1965, № 3, с. 254–257.
- Несмеянов С.А.* Схема строения моласс Юго-Западной Ферганы. М., 1966, с. 6–24. (Экспресс-информ. ЦБНТИ. Гипроводхоз. Сер. 7; Вып. 1).
- Несмеянов С.А.* Расчленение моласс и изменение природных условий Западного Тянь-Шаня в позднечетвертичную эпоху. – В кн.: Жизнь Земли. М.: Изд-во МГУ, № 4, 1967, с. 38–52.
- Несмеянов С.А.* Количественные палеорекострукции горного рельефа (на примере Западной Ферганы и смежных хребтов). – В кн.: Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек. М.: Изд-во МГУ, 1969а, с. 16–39.
- Несмеянов С.А.* Опыт количественной оценки величины и интенсивности позднеплейстоценовых движений в Западном Тянь-Шане. – Бюл. КИЧП, 1969б, 36, с. 26–40.
- Несмеянов С.А.* Количественная оценка новейших движений и неотектоническое районирование горной области (на примере Западной Ферганы и ее горного обрамления). М.: Недра, 1971а, 141 с.
- Несмеянов С.А.* О единой стратиграфической схеме континентальных новейших отложений Средней Азии и Казахстана. – В кн.: Жизнь Земли. М.: Изд-во МГУ, 1971б, с. 44–54.
- Несмеянов С.А.* Пенджикентская фауна млекопитающих, ее геологическая позиция и значение для стратиграфии среднеазиатского антропогена. М.: Изд-во МГУ, 1971в, с. 14–16.
- Несмеянов С.А.* Корреляция среднеазиатско-казахстанской и западносибирской стратиграфических схем континентальных олигоцен-неогеновых отложений. – В кн.: Жизнь Земли. – В кн.: Ломоносовские чтения и IV научно-отчетная конференция геологического ф-та. М.: Изд-во МГУ, 1972, № 8, с. 100–111.
- Несмеянов С.А.* Стратиграфия олигоцен-неогеновых моласс Западного Гиссаро-Алая. – В кн.: Жизнь Земли. М.: Изд-во МГУ, 1973, № 9, с. 89–102.
- Несмеянов С.А.* Корреляция континентальных толщ. М.: Недра, 1977а, 198 с.
- Несмеянов С.А.* Местонахождение млекопитающих в плиоценовых отложениях Тянь-Шаня. – В кн.: Междунар. симпозиум по пробл. "Граница неогена и четвертичной системы": Тез. докл. М.: Наука, 1977б, с. 15–17.
- Несмеянов С.А., Архангельский Д.Н.* Опыт корреляции стратиграфических схем континентальных верхнетретичных отложений Тянь-Шаня и Казахстана. – В кн.: Новейшая тектоника, новейшие отложения и человека. М.: Изд-во МГУ, 1972, с. 115–127.
- Несмеянов С.А., Макаров В.И.* Схема корреляции верхнетретичных моласс Тянь-Шаня. – В кн.: Пятая науч. конф. геол. фак. М.: Изд-во МГУ, 1970, с. 25–28.
- Несмеянов С.А., Макаров В.И.* Корреляция новейших отложений Тянь-Шаня. – Бюл. КИЧП, 1974а, 41, с. 82–98.
- Несмеянов С.А., Макаров В.И.* Корреляция верхнетретичных моласс Тянь-Шаня. – В кн.: Жизнь Земли. М.: Изд-во МГУ, 1974б, № 10, с. 74–81.
- Несмеянов С.А., Решетов В.Ю., Шмидт Г.А.* О фауне и возрасте Турайтырского местонахождения млекопитающих в Киргизии. – Бюл. МОИП. Отд. геол., 1977, 52, № 2, с. 83–86.
- Несмеянов С.А., Федоренко В.А.* О стратиграфии кайнозойских моласс Северо-Западной Ферганы. – В кн.: Вопросы региональной геологии СССР. М.: Изд-во МГУ, 1964, с. 161–170.
- Нихифорова К.В.* Кайнозой Голодной степи Центрального Казахстана. М.: Изд-во АН СССР, 1960, 255 с. (Тр. ГИН АН СССР; Вып. 45).
- Никонов А.А.* Кладбища древних животных в Таджикистане. – Природа, 1971, 3, с. 85–91.
- Никонов А.А.* К обоснованию стратиграфии верхнеплиоценовых и четвертичных отложений Аргано-Таджикской депрессии. – Бюл. КИЧП, 1972, 39, с. 31–49.
- Никонов А.А., Пеньков А.В., Трофимов Б.А.* и др. Новые данные по геологии и фауне млекопитающих верхнего плиоцена и нижнего плейстоцена Южного Таджикистана. – Бюл. МОИП. Отд. геол., 1971, 6, с. 146–147.
- Овечкин Н.К.* Биостратиграфия неогеновых отложений Тургайского прогиба и Северного Приаралья. М.: Госгеолтехиздат, 1962, 270 с. (Тр. ВСЕГЕИ. Новая сер.; Т. 77).
- Окладников А.П.* Исследование памятников каменного века Северного и Южного Таджикистана в 1956 г. Сталинабад: Изд-во АН ТаджССР, 1959, с. 46–48. (Тр. АН ТаджССР; Т. 103).
- Орлов Ю.А.* Новые местонахождения третичных млекопитающих в Казахстане. Природа, 1937, 9, с. 118–121.
- Орлов Ю.А.* Палеонтологическая экспедиция 1936 г. в Бетпак-Дала (Голодная степь Казахстана). М.: Изд-во АН СССР, 1941, с. 87–98. (Тр. ПИН АН СССР; Т. 8. Вып. 3).
- Орлов Ю.А.* В мире древних животных. 2-е изд. М.: Наука, 1968, 211 с. Основы палеонтологии. Млекопитающие. М.: Госгеолтехиздат, 1962, 421 с.
- Омураев М.К.* К стратиграфии палеоген-неогеновых отложений Алабуга-Нарынской впадины и о находке в них костных остатков млекопитающих. – Изв. АН КиргССР. Сер. физ.-техн. и мат. наук, 1978, 1, с. 30–31.
- Пахомов М.М.* Применение спорово-пыльцевого анализа для изучения новейших движений горных стран. – Изв. АН СССР. Сер. геогр., 1969, 4, с. 147–153.
- Пахомов М.М.* Изменение структуры растительного покрова гор востока Средней Азии как биостратиграфическая основа расчленения плейстоцена. – В кн.: Палинология плейстоцена и плиоцена. М.: Наука, 1973, с. 153–166.
- Пахомов М.М., Пенькова А.М., Ершова Л.Н.* Главнейшие климатические рубежи позднего кайнозоя Таджикистана. – В кн.: Междунар. симпозиум по пробл. "Граница неогена и четвертичной системы": Тез. докл. М.: Наука, 1977, с. 18–19.
- Пеньков А.В.* К палеомагнитной стратиграфии плиоцен-четвертичных отложений Таджикской депрессии. – В кн.: Хронология ледникового века. Л.: Изд-во ВГО, 1971, с. 130–135.
- Пеньков А.В., Гамов Л.Н., Додонов А.Е.* Сводный палеомагнитный разрез верхнеплиоцен-плейстоценовых отложений бассейна р. Кызылсу (Южный Таджикистан). – Изв. АН СССР. Сер. геол., 1976, 9, с. 33–43.
- Пенькова А.М.* О распространении пылиды *Ephedra* L. в верхнепалеогеновых и неогеновых отложениях Юго-Западного Таджикистана. – В кн.: Палинология кайнозоя. М.: Наука, 1973, с. 156–158.
- Перельман А.И.* Геохимия ландшафта. М.: Высш. школа, 1966, 392 с.
- Петрова О.Я.* Спорово-пыльцевые спектры континентальных кайнозойских моласс Юго-Восточной Ферганы. Ташкент, 1966, с. 88–96. (Науч. тр. Среднеаз. ун-та; Вып. 256).
- Петрушевский Б.А.* Палеогеография и тектоника Афганистана и Таджикистана. М.: Изд-во АН СССР, 1940, 69 с. (Тр. ИГН АН СССР. Сер. геол.; Вып. 8, № 3).
- Петрушевский Б.А.* Стрoение третичных отложений Тянь-Шаня. – Бюл. МОИП. Отд. геол., 1948, 1, с. 53–92.
- Петрушевский Б.А.* О подразделении континентальной третичной толщи Тянь-Шаня. – Докл. АН СССР, 1950, 75, № 2, с. 271–274.
- Петрушевский Б.А.* Урало-Сибирская эпигерцинская платформа и Тянь-Шань. М.: Изд-во АН СССР, 1955, 552 с.
- Плещенко И.В., Воронков А.К., Мещицкий Л.Ю., Шабалин М.А.* Ритмостратиграфическое расчленение кайнозойских моласс Чустпальской антиклиналя. Ташкент, 1967, с. 74–83. (Науч. тр. Среднеаз. ун-та; Вып. 326).
- Попов В.И.* Геологические условия формирования кайнозойских моласс Ферганы. Ташкент: Госиздат, 1940, 96 с.
- Попов В.И.* Литология кайнозойских моласс Средней Азии. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1954, Т. 1, 524 с.
- Попов В.И.* Общая схема стратиграфического расчленения неогеновых континентальных формаций Востока Средней Азии. Ташкент, 1964, с. 133–163. (Науч. тр. Среднеаз. ун-та. Новая сер.; Вып. 249).
- Попов В.И.* Вопросы учения о формациях на XXII сессии Международного геологического конгресса. – В кн.: К геохимии и литологии Средней Азии. Ташкент, 1965, с. 3–13.
- Попов В.И., Бабадаглы В.А.* Фашиально-палеогеографические карты неогеновых формаций Южно-Таджикской депрессии. Ташкент, 1964, с. 56–62. (Науч. тр. Среднеаз. ун-та; Вып. 256).
- Попов В.И., Вергунов Л.Н.* Фашиально-петрографическая характеристика палеогеновой бентонитовой формации Иссыккульской впадины. Ташкент, 1972, с. 41–46. (Науч. тр. Среднеаз. ун-та; Вып. 431).
- Попов В.И., Гриднев Н.И.* Схема ритмостратиграфии кайнозойских моласс Южно-Таджикской депрессии. Сталинабад, 1953, с. 126–128. (Тр. Ин-та геологии АН УзССР; Т. 9).
- Попов В.И., Макарова С.Д., Станкевич Ю.В., Филиппов А.А.* Руководство по определению осадочных фашиальных комплексов и методика фашиально-палеогеографического картирования. Л.: Госгеолтехиздат, 1963, 714 с.
- Попов В.И., Садовская Н.А., Теленок А.С.* Ферганская впадина: Неогеновая систе-

- ма. — В кн.: Геология СССР. М.: Недра, 1972, т. 23, кн. 1, с. 648—664.
- Попов Г.И.** Апшеронский ярус Туркмении. Ашхабад, 1961. 430 с.
- Попов Г.И.** О соотношениях континентальных и морских верхнеплиоценовых отложений юго-востока Европейской части СССР в связи с вопросом о нижней границе четвертичного периода. — Тр. КИЧП, 1962, 20, с. 92—97.
- Пояркова З.Н.** Меловая система. — В кн.: Геология СССР. М.: Недра, 1972, т. 25, кн. 1, с. 224—236.
- Пуаре И.В.** Ходженгитские месторождения поваренной соли в Фергане. М., 1931. 76 с. (Тр. ГГРУ, 100).
- Пулатова М.З.** К палинологической характеристике неогеновых отложений Южного склона Гиссарского хребта. — Докл. АН ТаджССР, 1966, 9, № 5, с. 28—30.
- Пулатова М.З.** Спорово-пыльцевая характеристика пограничных слоев палеогена и неогена южного склона Гиссарского хребта. — В кн.: Литология и стратиграфия нефтегазоносных толщ Таджикской депрессии. Душанбе: Дониш, 1972, с. 162—183.
- Пулатова М.З., Бабков К.В., Васильев И.В.** О находке остатков растений в неогеновых отложениях южного склона Гиссарского хребта. — Докл. АН ТаджССР, 1964, 7, № 7, с. 34—36.
- Путеводитель по геологическим маршрутам Южного Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1961. 119 с.
- Путеводитель экскурсий: Междунар. симпозиум по пробл. "Граница неогена и четвертичной системы". М.: Наука, 1977. 183 с.
- Размыслова С.С.** Стратиграфия палеогеновых отложений северо-западного и северного чинков Устюрта. Л.: Гостоптехиздат, 1956, с. 112—128. (Тр. ВНИГРИ. Новая сер.; Вып. 95).
- Размыслова С.С.** Стратиграфия миоценовых отложений северо-западного и северного чинков Устюрта. Л.: Гостоптехиздат, 1962, с. 339—374. (Тр. ВНИГРИ; Вып. 190).
- Разумова В.И.** Меловые и третичные формации западной части Центрального и Южного Казахстана. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 227 с. (Тр. ИГН АН СССР; Вып. 46).
- Ранов В.А.** Чем работат неандерталец? — Коммунист Таджикистана, 1974, 13 дек., № 174.
- Ранов В.А., Несмеянов С.А.** Палеолит и стратиграфия антропогена Средней Азии. Душанбе: Дониш, 1973. 161 с.
- Расцветов Л.М.** Основные черты строения молассовой формации Копет-Дага. — Докл. АН СССР, 1969, 186, № 1, с. 162—165.
- Расцветов Л.М.** Основные черты новейшей тектоники Копет-Дага. — В кн.: Новейшая тектоника, новейшие тложения и человек. М.: Изд-во МГУ, 1972, сб. 3, с. 35—70.
- Решение совещания по выработке рабочей схемы стратиграфии новейших отложений востока Средней Азии. Ташкент, 1964, с. 72—75. (Науч. тр. Среднеаз. ун-та; Вып. 256).
- Решение совещания по разработке унифицированных стратиграфических схем Средней Азии. Ташкент, 1959. 130 с.
- Решетов В.Ю.** Обзор раннетретичных тапирообразных Монголии и СССР. — В кн.: Исследуемая фауна и флора Монголии. М.: Наука, 1975, с. 19—53. (Тр. Совм. Сов.-Монгол. палеонтол. экспедиции; Вып. 2).
- Решетов В.Ю.** Раннетретичные тапирообразные Монголии и СССР: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. М., 1977. 34 с.
- Решетов В.Ю.** Раннетретичные тапирообразные Монголии и СССР. М.: Наука, 1979. 141 с. (Тр. Совм. Сов.-Монгол. палеонтол. экспедиции; Вып. 11).
- Решетов В.Ю., Шевырева Н.С., Трофимов Б.А., Чиквадзе В.М.** Позвоночные местонахождения Андрак II (средний эоцен). — Бюл. МОИП. Отд. геол., 1978, 53, № 3, с. 151—152.
- Ржанникова Л.Н.** Палинологическая характеристика палеогена и неогена Зайсанской впадины. Алма-Ата: Наука, 1968. 224 с.
- Резвой Д.П.** Тектоника восточной части Туркестано-Алайской горной системы. Львов, 1959. 370 с.
- Резолюция совещания по разработке унифицированной стратиграфической шкалы третичных отложений Крымско-Кавказской области. — В кн.: Тр. Совещ. по разработке унифицир. стратигр. шкалы третичных отложений Крымско-Кавказской обл. Баку: Изд-во АН АзССР, 1959, с. 307—312.
- Рыжков О.А.** К стратиграфии древнетретичных дислоцированных отложений Ферганы. — Докл. АН УзССР, 1952, 6.
- Рыжков О.А.** К вопросу о соленосной свите гор Ак-Бель, Кызыл-Джар. — Изв. АН УзССР, 1954, 5, с. 69—74.
- Розыева Т.Р., Узakov О.** Стратиграфия, фауны и фауна нижне- и среднемиоценовых отложений Копет-Дага и Предкопетдагской впадины. Ашхабад, 1962, с. 5—48. (Тр. Ин-та геологии АН ТССР; Т. 4).
- Розыева Т.Р., Узakov О.** Стратиграфия верхнего миоцена Центрального, Западного Копет-Дага и Прикопетдагской впадины. — В кн.: Вопросы геологии Туркмении. Ашхабад: Туркмениздат, 1965, с. 87—99.
- Рубинштейн М.М., Габуния Л.К.** Некоторые вопросы геохронологии кайнозой. — Изв. АН СССР. Сер. геол., 1972, 3, с. 3—8.
- Рябинин А.Н.** Новая черепаха из нижнетретичных отложений Семиречья. — Изв. Геолкома, 1927, № 3, 46, с. 193—200.
- Савинов П.Ф.** Материалы к остеологии гигантских носорогов-индикотерид. — В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1963, т. 4, с. 77—82.
- Савинов П.Ф.** Тушканчиковые (Dipodidae, Rodentia) неогена Казахстана. — В кн.: Материалы по эволюции наземных позвоночных. М.: Наука, 1970, с. 91—134.
- Савинов П.Ф.** Тушканчиковые (Dipodidae, Rodentia) палеогена и неогена Казахстана: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. Алма-Ата, 1974. 22 с.
- Садовская Н.А.** Распространение и стратиграфическое значение пыльцы и спор в кайнозойских отложениях Северо-Западной Ферганы: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. Ташкент, 1954. 11 с.
- Садовская Н.А.** Палеоклиматическое и биостратиграфическое расчленение кайнозойских молассовых формаций Западной Ферганы по данным палинологического анализа: Тез. докл. к Совещ. по унификации стратигр. схем Средней Азии. М.: Гостеолтехиздат, 1958, с. 183—186.
- Свиточ А.А.** Сыртовая толща и ее стратификация. — Сов. геология, 1969, 3, с. 134—137.
- Сикстель Т.А.** К стратиграфии меловых и третичных отложений бассейна оз. Иссык-Куль. — За недра Средней Азии, 1934, 4, с. 59—62.
- Сикстель Т.А.** Растительные остатки из третичных отложений Киргизии. Ташкент, 1939. 15 с.
- Сикстель Т.А., Худайбердыев Р.** О флорах прошлого Средней Азии. — В кн.: Палеоботаника Узбекистана. Ташкент: Фан, 1968, т. 1, с. 3—87.
- Синицын В.М.** Центральная часть Чаткальского хребта. — В кн.: Геология Узбекской ССР. М., 1937, т. 1, с. 203—254.
- Синицын В.М.** Введение в палеоклиматологию. Л.: Наука, 1967. 232 с.
- Скворцов Ю.А.** Генетические типы четвертичных отложений в речных долинах. — Изв. Узб. фил. Всесоюз. геогр. о-ва, 1956, 2(23), с. 11—34.
- Скворцов Ю.А.** Новейшие тектонические движения в бассейне р. Сырдарья. — В кн.: Современные движения земной коры. М.: Изд-во АН СССР, 1963, ч. 1, с. 348—353.
- Славин В.И., Мирзод С.Х.** Тектоника Афганистана. — Сов. геология, 1969, 4, с. 68—81.
- Смирнов Л.Н., Ибрагимов М.С.** Неоген Юго-Восточного Туркменистана. — В кн.: Вопросы геологии Туркмении. Ашхабад: Туркмениздат, 1965, с. 121—137.
- Соколов Б.С.** Биохронология и стратиграфические границы. — В кн.: Проблемы общей и региональной геологии. Новосибирск: Наука, 1971, с. 155—178.
- Солун В.И.** Некоторые вопросы стратиграфии третичных отложений Таджикской депрессии. — Учен. зап. ЛГУ. Сер. геол., 1959, 10, № 268, с. 208—219.
- Сотникова М.В.** Хищные млекопитающие виллафранка Центральной и Средней Азии. — В кн.: Первый Междунар. конгр. по млекопитающим. М.: Изд-во ВИНТИ, 1974, т. 2, с. 221.
- Стратиграфическая классификация, терминология и номенклатура. Л.: Недра, 1965. 70 с.
- Страхов Н.М.** Типы климатической зональности в послепетрозойской истории Земли и их значение для геологии. — Изв. АН СССР. Сер. геол., 1960, 3, с. 3—25.
- Страхов Н.М.** Основы теории литогенеза. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 212 с.
- Судо М.М.** Актелпикские слои Центрального Копет-Дага. — Изв. АН ТССР. Сер. физ.-тех., хим. и геол. наук, 1967, 2, с. 89—92.
- Судо М.М.** Соотношение аналогов байгубекского горизонта Юго-Восточной Туркмении и нижнего миоцена Центрального и Восточного Копет-Дага. — Изв. ТССР. Сер. физ., тех., хим. и геол. наук, 1968, 6, с. 103—106.
- Судо М.М., Крымус В.Н.** Устричники *Ostrea gruphoidea* Schloth. в Копет-Даге и возраст Карагауданской свиты. — Изв. АН ТССР. Сер. физ., тех., хим. и геол. наук, 1966, 5, с. 111—113.
- Сукачева М.П., Шахова А.Н., Захарова М.Г.** К стратиграфии и литологии палеогеновых отложений Западного Копет-Дага. — В кн.: Геология и нефтегазоносность западной части Средней Азии. Л.: Гостеолтехиздат, 1961, с. 229—253. (Тр. ВСЕГЕИ. Новая сер.; Т. 4. Вып. 2).
- Талипов М.А.** Некоторые вопросы биостратиграфии четвертичных отложений на примере опорного разреза Киргизского Тянь-Шаня. — В кн.: Проблемы изучения четвертичного периода. Хабаровск, 1968, с. 126—127.
- Тарасов С.А.** Исследуемые позвоночные мела, палеогена и неогена северо-восточной Киргизии и их стратиграфическое значение. — Изв. АН КиргССР, 1968а, 2, с. 62—64.
- Тарасов С.А.** Стратиграфия палеоген-неогеновых отложений Кочкорской впадины (Киргизия) на основе изучения ископаемых позвоночных: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. Фрунзе, 1968. 18 с.
- Тарасов С.А.** К вопросу о стратиграфии палеоген-неогеновых отложений Кочкорской впадины. — В кн.: Материалы по геологии кайнозой и новейшей тектонике Тянь-Шаня. Фрунзе: Илим, 1970, с. 52—68.
- Тарасов С.А.** О стратиграфической номенклатуре палеоген-неогеновых отложений Северо-Восточной Киргизии. — В кн.: Материалы по новейшему этапу геологического развития Тянь-Шаня. Фрунзе: Илим, 1971, с. 4—9.
- Твенхофел У.Х.** Учение об образовании осадков. М.; Л.: ОНТИ, 1936. 916 с.
- Теленков А.С.** К стратиграфии и литологии кайнозойских моласс Юго-Восточной Ферганы. Ташкент: Наука, 1964, с. 78—87. (Науч. тр. Среднеаз. ун-та; Вып. 256).
- Тетюхин Г.Ф., Ерошкин А.Ф., Попов В.И.** О границе неогеновых и четвертичных отложений в Узбекистане. — В кн.: Междунар. симпозиум по пробл. "Граница неогена и четвертичной системы": Тез. докл. М.: Наука, 1977, с. 22—23.
- Тимуш А.В.** К стратиграфии континентального олигоцена Западной Бетпак-Далы. — Изв. АН КазССР. Сер. геол., 1966, 3, с. 65—67.
- Толстикова Н.В., Мешицкий Л.Ю., Шпора Л.Д.** О возрасте тавильдаринской ритмосвиты Северо-Западной Ферганы. — Докл. АН УзССР, 1974, 10, с. 49—50.
- Трофимов Б.А.** Древнейший представитель примитивных свиней в Азии. — Докл. АН СССР, 1949, 67, № 1, с. 145—148.
- Трофимов Б.А.** Местонахождение гиппарноновой фауны в Киргизии. — Палеонтол. журн., 1959, 1, с. 145.

- Трофимов И.И.* Четвертичные отложения Юго-Западного Таджикистана. — В кн.: Геология СССР. М.: Госгеолтехиздат, 1959, т. 24, ч. 1, с. 358—368.
- Трубилин В.М.* Палеомагнетизм и стратиграфия акчагыльских отложений Западной Туркмении. М.: Наука, 1977. 79 с.
- Туаев Н.П.* Верхнеамударьинская впадина, ее границы и основные черты геологического строения. — Изв. АН СССР. Сер. геол., 1961, 5, с. 66—75.
- Турбин Л.И.* К альпийской тектонике Тянь-Шаня. — В кн.: Стратиграфия кайнозоя и некоторые вопросы новейшей тектоники Северной Киргизии. Фрунзе: Илим, 1966, с. 3—18.
- Турбин Л.И., Александрова Н.В.* Палеогеография "великих озер" Тянь-Шаня. — В кн.: Географические исследования в Киргизии. Фрунзе: Илим, 1970, с. 15—16.
- Турбин Л.И., Александрова Н.В., Конохов А.Г.* Палеоген и неоген Северо-Восточной Киргизии: Четвертичная система. — В кн.: Геология СССР. М.: Недра, 1972, т. 25, ч. 1, с. 256—268.
- Турбин Л.И., Сабдушев Ш.Ш., Черепанов А.А., Янушев Ю.Д.* Антропоген Киргизского Тянь-Шаня. — В кн.: Стратиграфия кайнозоя и некоторые вопросы новейшей тектоники Северной Киргизии. Фрунзе: Илим, 1966, с. 69—96.
- Тхостов В.А.* Арганистан. — Геология нефти и газа, 1957, 9, с. 61—64.
- Узakov О.* Биостратиграфическое расчленение нижне- и среднемиоценовых отложений предгорий Западного и Центрального Копет-Дага. — Изв. АН ТССР. Сер. физ., тех., хим. и геол. наук, 1966, 1, с. 101—108.
- Федоров П.В.* Стратиграфия четвертичных отложений и история развития Каспийского моря. М.: Изд-во АН СССР, 1957. 297 с. (Тр. ГИН АН СССР; Вып. 10).
- Флеров К.К.* Об остатках *Gazella* из неогена Джунгарского Алатау. — В кн.: Ежегодник Русского палеонтологического общества (1934—35), 1937, 11, с. 136—138.
- Флеров К.К.* Об остатках *Gazella* из Бетпакады. — Докл. АН СССР, 1938, 21, № 1—8, с. 95—96.
- Флеров К.К.* Морфология и экология оленеобразных в процессе их эволюции. — В кн.: Материалы по четвертичному периоду. М.: Изд-во АН СССР, 1950, вып. 2, с. 50—69.
- Флеров К.К.* К вопросу о биологической и палеозоологической характеристике индрикотериевой фауны. — Палеонтол. журн., 1961, 1, с. 12—22.
- Фортун А.Б.* Результаты спорово-пыльцевых исследований полного разреза палеогено-неогеновых отложений восточной части Иссыккульской впадины. — В кн.: Дисперсные остатки ископаемых растений Киргизии. Фрунзе: Илим, 1971, с. 91—99.
- Херасков Н.П.* Тектонический очерк юго-западного окончания Гиссарского хребта и некоторых прилежащих к нему районов. — Бюл. МОИП. Отд. геол., 1932, 10, вып. 3/4, с. 428—460.
- Хозацкий Л.И.* Черепашьего рода *Stemmys* тритичной фауны Казахстана. — Изв. АН КазССР. Сер. зоол., 1947, 6, с. 125—129.
- Хозацкий Л.И.* Наземная черепаха неогена Северного Тянь-Шаня. — В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1958, т. 2, с. 39—54.
- Хозацкий Л.И., Кузнецов В.В.* Новая находка неогеновой черепахи в Северном Тянь-Шане. — В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1963, с. 3—11.
- Хозацкий Л.И., Кузнецов В.В.* Пресноводная черепаха олигоцен-Джунгарского Алатау. — В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1971, т. 5, с. 34—51.
- Хозацкий Л.И., Кузнецов В.В., Леонов А.В.* Новый вид миоценовой черепахи юго-востока Казахстана. — В кн.: Фауна и флора из мезокайнозоя Южного Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1974, с. 22—30.
- Худайбердыев Т.Н.* Ископаемые млекопитающие Восточного Узбекистана: Тез. докл. совещ. "Каменный век Средней Азии и Казахстана". Ташкент, 1972, с. 94—95.
- Худайбердыев Т.Н.* Материалы по териофауне Северо-Восточного Узбекистана в позднем антропогене: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. Ташкент, 1973. 24 с.
- Чедия О.К.* Юг Средней Азии в новейшую эпоху горообразования. Фрунзе: Илим, 1971. Кн. 1. 331 с.
- Чедия О.К., Васильев В.А.* О характере и возрасте древнего оледенения северного склона хребта Петра I. Сталинабад, 1960, с. 101—117. (Тр. Тадж. ун-та; Т. 28. Вып. 1).
- Чедия О.К., Лоскутов В.В.* Палеогеография Памира и сопредельных стран в плиоцен-четвертичное время. — В кн.: Четвертичный период и его история. М.: Наука, 1965, с. 209—222.
- Чедия О.К., Язовский В.М., Фортун А.Б.* О стратиграфическом расчленении киргизского красноцветного комплекса в Чуйской впадине и ее горном обрамлении. — В кн.: Закономерности геологического развития Тянь-Шаня в кайнозое. Фрунзе: Илим, 1973, с. 25—52.
- Чердынцев В.В.* Уран-234. М.: Атомиздат, 1969. 307 с.
- Чернышев Ф.Л.* К глубокому разведочному бурению на нефть в районе Чуст-Панской антиклинали. — Изв. Узб. фил. АН СССР, 1941, 4, с. 40—45.
- Черняховский А.Г.* Элювий и продукты его переотложения: (Казахстан и Средняя Азия). М.: Наука, 1966. 179 с. (Тр. ГИН АН СССР; Вып. 145).
- Чистяков А.А.* К геологическому строению и неотектонике верховьев р. Зеравшан. — Вестн. МГУ. Сер. биол., почвовед., геол. и геогр., 1958, 2, с. 137—146.
- Чистяков А.А.* История развития восточной части бассейна р. Зеравшан в неоген-четвертичное время. — В кн.: Проблемы геологии и палеогеографии антропогена. М.: Изд-во МГУ, 1966, с. 135—155.
- Чихачев П.К., Солун В.И.* Морские палеогеновые отложения: (Третичные отложения Юго-Восточного Таджикистана). — В кн.: Геология СССР. М.: Госгеолтехиздат, 1959, т. 24, ч. 1, с. 308—315.
- Чуришина Н.М.* Душанбинский артезианский бассейн и его минеральные и термальные воды. Душанбе: Дониш, 1972, 209 с.
- Шанцер Е.В.* Очерки о генетических типах континентальных осадочных образований. М.: Наука, 1966. 239 с. (Тр. ГИН АН СССР; Вып. 161).
- Шанцер Е.В., Микულიна Т.М., Малиновский В.Ю.* Кайнозой центральной части Казахского щита. М.: Изд-во МГУ, 1967. 351 с.
- Шарапов Ш.* Обзор местонахождений плиоцен-нижнеплейстоценовых наземных млекопитающих Таджикистана. — В кн.: Вопросы зоологии Таджикистана. Душанбе: Дониш, 1972, с. 216—231.
- Шарапов Ш.* Новая находка *Nyctereutes Temminck*, 1839 в Таджикистане. — Докл. АН ТаджССР, 1981, 24, № 3, с. 190—194.
- Шевченко Г.М., Плещенко И.В., Теленко А.С., Джулиев А.Х.* Глинистые минералы кайнозойских молассовых формаций Юго-Западной Ферганы. Ташкент, 1972, с. 208—211. (Науч. тр. Среднеаз. ун-та; Вып. 431).
- Шевырева Н.С.* Грызуны и зайцеобразные из неогена южной части Зайсанской котловины. — Бюл. МОИП. Отд. геол., 1968, 34, № 4, с. 156.
- Широков В.Я.* Тектоническое строение южной окраины Таджикской депрессии. М.: Госгиптехиздат, 1962, с. 152—175. (Тр. Моск. ин-та им. Губкина; Вып. 36).
- Шлыгин Е.Д., Казанли Д.Н., Лавров В.В.* Параллелизация третичных толщ равнинных и горных областей Казахстана. — Вестн. АН КазССР, 1952, 8, с. 80—83.
- Шнора Л.Д., Плещенко И.В.* Об отложениях озерной и болотной фаций в бурой свите нижнего и среднего плиоцена гор Сунетау. Ташкент, 1964, с. 132—135. (Науч. тр. Среднеаз. ун-та. Новая сер.; Вып. 256).
- Шульц С.С.* Анализ новейшей тектоники и рельеф Тянь-Шаня. М.: ОГИЗ, 1948. 222 с.
- Щеглова В.В.* О находке остатков млекопитающих в кайнозойских континентальных толщах Гиссарского хребта. — Докл. АН УзССР, 1953, 3, с. 19—21.
- Щеглова В.В.* Две находки остатков ископаемых млекопитающих в Приташкентском районе. — Докл. АН УзССР, 1954, 2, с. 19—20.
- Эберзин А.Г.* Южный Мангышлак, Устюрт, Туаркыр, Сарыкамшыкская впадина, Узб. и Кунядаринская дельта (неоген). — В кн.: Геология СССР. М.: Госгеолтех-
- издат, 1957, т. 22, ч. 1, с. 250—259.
- Эберзин А.Г.* Схема стратиграфии морских неогеновых отложений Закаспия. — Бюл. МОИП. Отд. геол., 1958, 33, № 2, с. 138—140.
- Эберзин А.Г.* Схема стратиграфии неогеновых отложений юга СССР. — В кн.: Тр. совещ. по разработке унифицир. стратигр. шкалы третичных отложений Крымско-Кавказской обл. Баку: Изд-во АН АзССР, 1959, с. 41—47.
- Эберзин А.Г., Клейнер Ю.М.* Об акчагыле Мангышлака. — Докл. АН СССР, 1958, 120, № 2, с. 397—399.
- Юрьев А.А.* О новейших тектонических движениях и строении Пенджикентской впадины в связи с ее возможной нефтегазосностью. — Узб. геол. журн., 1963, 3, с. 76—82.
- Юрьев А.А.* К положению границы между неогеновой и четвертичной (антропогеновой) системами в Узбекистане. — В кн.: Проблемы геологии и полезных ископаемых Узбекистана. Ташкент: Наука, 1964, с. 73—82.
- Юрьев А.А.* Некоторые вопросы геоморфологического анализа и картирования рельефа Средней Азии (на примере Узбекистана). — Узб. геол. журн., 1966, 2, с. 81—87.
- Юрьев А.А., Умаров А.У.* Геоморфология и новейшая тектоника Западного Узбекистана. Ташкент: Фан, 1971, с. 116.
- Яковлев В.Н.* Рыбы из миоценовых отложений Киргизии. — Палеонтол. журн., 1959, 3, с. 107—111.
- Яковлев Д.И.* Голодная степь Казахстана. — Тр. Каз. фил. АН СССР, 1938, 13.
- Яниш А.Л.* Геология Северного Приаралья. М.: МОИП, 1953. 736 с.
- Dmitrieva E.L.* Tajikistan's and India's fossil Alcelaphinae. — J. Paleontol. Soc. India, 1977, 20, p. 97—101.
- Eames E.E.* On the age of the Bugti beds, Baluchistan. — Geol. Mag., 1950, 87, N 1, p. 53—56.
- Godina A.Ja.* On new finds of sivatheriinae on the territory of the USSR. — J. Paleontol. Soc. India, 1977, 20, p. 21—25.
- Orlov V.* Tertiary Mammals of Kazakstan. — J. Mammal., 1938, 19, N 4, p. 475—477.
- Radinsky L.B.* Early Tertiary Taproidea of Asia. — Bul. Amer. Mus. Natur. Hist., 1965, 129, art. 2, p. 183—263.
- Trofimov V.A.* Primate *Paradolichopithecus suskini* sp. nov. from upper pliocene of the Pamirs piedmont. — J. Paleontol. Soc. India, 1977, 20, p. 26—32.