

HET NEDERDUITSCH

ZUID-AFRIKAANSCH

TYDSCHRIFT.

DEEL VI.

1829.

KAAPSTAD:

GEDRUKT BY GEORGE GREIG, KEIZERSGRACHT.

1829.

Den 29 dito.—Quam des namiddags weder eenig vreemd volk uyt 't land met een trop van omtrent 40 koebeesten ende 50 schapen, voorby 't Fort langs strand dezelve heen dryvende na Herrys woning, daarse haar leger by neder sloegen, ende weinig daarna Herry met dezelve aankomende, dezen avond aan ons nog verhandelde 9 stux schone vette koebeesten ende 2 schapen, seggende Herry datse morgen ende overmorgen ons meer toebrengen zouden, wordende nu avond ende moesten derhalven om dat se vermoeyt waren ende wat tabak gekregen hadden nu gaan rusten ende dien tabak eerst opzuygen.

Ultimo do.—Kregen heden nog 26 stux koebeesten ende 4 schapen, voor coper, tabak ende pypen, van 't voornoemde nieuwe volk uyt 't land afgekomen, verzoevende Herry voor zyn gedane debvoiren wat coper voor hem, 't welk denzelven gaarne toestonden, ende om hem te animeren, vereerden met 6 lb. draat coper ende wat tabak, dat een klyne cortagie is, ten reguarde van de diensten die de Comp. in deze gelegentheyd is doende, alsoo sedert den 23 passato al 67 stux koebeesten, behalven 13 of 14 schapen heeft doen aanbrengen ende aan de Comp. verhandelen; wetende ook in de handelinge t'onser genoeg en wel te maken, dat zyn cortagie genoegzaam uytgewonnen word.

(Het vervolg hierna.)

(Uit het Engelsch.)

Doctor Smith's Beschryvingen van nieuw ontdekte of onvolmaakt bekende voorwerpen uit het Dierenryk, die door hem in Zuid-Afrika gevonden worden.

Familie VULTURIDAE.

PERCNOPTERUS CARUNCULATUS (Mihl.)—Het voorhoofd, de kruin, de zyden van het hoofd, en het bovenste gedeelte van den hals naakt, en purperkleurig met acht of tien kleine witte overdwarsche uitwassen op het laatstgemelde. Het gewricht en bovenste gedeelte van den nek, en het benedenste gedeelte van den hals, met een ligt roodachtig bruin dons, en tusschen het bene-

denste gedeelte van den hals en de reeds gemelde uitwassen eene groote ovale vlek van zwart dons; het onderste gedeelte van den nek, tusschen de schouders, en op den rug, donker bruin, met alle de vederen aan rand en top iets ligter van kleur; de schouders byna gelyk van kleur. De voornaamste slagpennen zwartachtig met een graauwen tint naby de schachten; die van den tweeden rang, zoo mede de staart, welke wig-vormig is, zwartachtig bruin; de borst en buik zwartachtig bruin, met de vederen aan de randen en toppen ligter van kleur, dan in het midden; de dyen met een wit dons overdekt, met nog eenige lange bruine vederen aan de buitenzyde van ieder derzelve; de pooten en teenen bleek groenachtig blaauw; de klauwen zwart; de bek groenachtig zwart aan den wortel en donker hoornkleur aan het uiteinde; de oogen donker bruin. De lengte van den vogel is van twee voeten en twee duimen; de breedte, van het eene tot het andere uiteinde der vleugelen, vyf voeten en zes duimen. Hy bewoont de noord-oostelyke streken der Kolonie, en wordt niet schaars gevonden omtrent den oorsprong der Oranje-Rivier.

Familie FALCONIDAE.

Het geslacht door my genoemd POLYBOROIDES.—De bek zamengedrongen, inzonderheid van boven, matiglyk gehoekt; de neusgaten langwerpig en naauw; het *ceroma* zacht; de zyden van het hoofd, op een kleinen afstand van de oogen, bloot; de onderpooten lang, tener, en *gereticuleerd*; de klauwen zamengedrukt en scherp; de vierde slagpen de langste.

POLYBOROIDES TYPUS, (Mihi).—Heeft het voorhoofd, de kruin, den nek, de tusschenruimte tusschen de schouderbladen, en den rug, schoon graauw, zoo als ook de schouders en schouderbladen, doch op welke deze kleur hier en daar met smalle golvende en donker bruine lynen afgewisseld is; de meeste vederen op den schouder hebben ook ieder eene groote zwarte verhevenheid naby den top; de voornaamste dekpenneren der vleugelen zyn donker graauw, ieder met eene groote donkerkleurige verhevenheid omtrent den witten top derzelve; de dek-

pennen van den tweeden rang zyn als de eersten gekleurd, doch het graauw een weinig ligter. De vleugelpennen van den eersten rang zyn graauw naby de schachten, doch voor het overige blinkend zwart, met uitzondering van de toppen van eenigen meest binnenwaarts, die wit zyn; die van den tweeden rang hoofdzakelyk graauw, ieder met een breede zwarte doorloopende streep naby den witten top derzelve; de staart lang, gerond, blinkend groenachtig zwart, met een breedten wit met zwart gevlekten band aan het einde, en de punten van alle de vederen wit; zoo wel als een klein gedeelte van de waaijers van ieder derzelve naby de schachten; de onderkaak, hals en borst een schoon eenvormig graauw; de buik, stuit, binnenzijde der schouders, achterste gedeelte van den rug en geheel over de dyen, net gestreept met dwars overloopende zwarte en witte strepen; de onderpooten en teenen geelachtig bruin; de klaauwen donker hoornkleur; de oogkringen en de washuid naar het oranje overhellende; de bek donker hoornkleur. De lengte van den vogel is van twee voeten en vier duimen. Men vindt hem, ofschoon zeer schaars, in de oostelyke gedeelten der Kolonie en in het Kafferland; hy is ook een inwoner van Madagaskar.

CIRCÆTUS PECTORALIS, (*Mihi*).—Van boven donker of zwartachtig bruin; de vederen van de schouders en romp, zoo wel als van de schouderbladen, met roodachtige witte toppen en randen; de dekvederen, zoo van den eersten als den tweeden rang, der vleugelen, met overdwarsche banden graauwachtig en zwart, en wit getopt; de slagpennen van den eersten rang zwartachtig bruin, met uitzondering van de binnenzijde der vederen, naby de schacht, die wit is; die van den tweeden rang met overdwarsche graauwe en zwarte banden, en witte toppen; de staart lang, effen, graauw en zwart of bruinachtig en zwart geband; de toppen der vederen wit of vuil roodachtig wit; de onderkaak, hals, en min of meer van de borst, zwartachtig bruin; het overige van het onderlyf zuiver wit; de washuid naar het gele neigende; de bek groenachtig geel aan den wortel en zwart aan den top; de pooten vleesch wit; de klaauwen zwart; de oogen roodachtig oranje. De lengte van den vogel is omtrent twee voeten en vier duimen.

Tot aan het einde van zyn eerste jaar is hy over het geheele ligchaam eenvormig roodachtig bruin, waarna hy begint te veranderen en de reeds beschreven kleuren aan te nemen. Hy bewoont de meeste streken der Kolonie, zoo wel als de meer binnenlands gelegen deelen van Zuid-Afrika.

AQUILA VULTURINA, (Mih).—Het wyfje.—Het voorhoofd, de kruin, de nek, de vederen tusschen de beide schouderbladen en van den rug, bleek taanachtig, met hier en daar een bruine vlek; de dekpenne van den staart taanachtig of vuil wit; de schouders taanachtig met bruin afgewisseld; de schouderbladen zwartachtig bruin, min of meer onderscheiden getopt met roodachtig wit; de slagpenne van den eersten rang zwartachtig bruin, sommigen derzelve aan de buitenzyde van de waayers met taanachtig rood gerand, en alle roodachtig wit aan de toppen; die van den tweeden rang donker vuil bruin, smal gerand en getopt met roodachtig wit; de vederpenne van den eersten rang zwart; die van den tweeden rang zwartachtig bruin op de buitenzyde van de waayers, aan de binnenzijde graauwachtig met verscheidene overdwarsche donkere banden; de toppen van allen taankleurig rood; de staart gerond, bruinachtig graauw, en met vele vlekken, die als smalle niet zeer onderscheidbare banden van een donker zwarte kleur daarover loopen; de toppen der vederen alle taanachtig; het onderlyf taanachtig met bruin afgewisseld, vooral op de zyden en aan het voorste gedeelte van hetzelfde; de dyen donker roestkleurig; de toonen en washuid geel; de klauwen donker hoornkleur; de bek een fletsch blaauw omtrent de washuid, donker hoornkleur omtrent het uiteinde; de oogen roodachtig bruin. De lengte van den vogel is van omtrent twee voeten en vier duimen. Hy aast voornamelyk op krogen, en wordt in het algemeen door geheel Zuid-Afrika gevonden in het gezelschap van gieren. De jonge vogels zyn geheel over het ligchaam van eene taanachtige kastanjebruine kleur, en niet met bruin afgewisseld zoo als men by de ouden bespeurd.

ACCIPITER SELBYII, (Mih).—Het voorhoofd, de kruin, de nek, de vederen tusschen beide schouderen, de rug, en bovenste dekpenne van den staart, een dof

bruin; sommige der vederen van het gewricht boven den nek wit naby de schachten, daardoor aan de oppervlakte van den nek een eenigzins zich afwisselend voorkomen gevende; de nekvederen der vleugelen van den eersten en den tweeden rang donker zwartachtig bruin; de slagpennen van den eersten rang bruin, met de binnenzijden van de waayers min of meer met witte banden afgewisseld; die van den tweeden rang even zoo gekleurd; de staart ligt bruin, met drie onderscheidene donkere zwartbruine banden dwars daarover; de toppen van alle de vederen roodachtig wit; de onderkaak, hals, borst, buik en dyen wit; de drie laatstgemelde met dwars daarover loopende bruine lynen, welke op de buik zoo wel als op de zyden zeer talryk zyn; de pooten en toonen geel; de washuid donker geel; de bek en klauwen donker hoornkleur. De lengte van den vogel is van zeventien duimen. Hy bewoont de Noord-oostelyke streken der Kolonie.

FALCO RUPICOLORIDES, (Mihi.)—Het voorhoofd, de kruin, en *corvex* ligt taankleurig met talryke, daar langs gaande smalle zwarte streken; de vederen tusschen de beide schouders, op den rug, de schouders en schouderbladen, eene donkerder taankleur met breede overdwarssche golvende bruinachtige banden; de toppen der vederen licht taankleurig; de dekvederen der vleugels van den eersten en den tweeden rang beurtelings bruin en taankleurig geband, de toppen taanachtig wit; de slagpennen van den eersten rang bruin, uitgezonderd een aanzienlyk gedeelte van de binnenzijde der waayers, die allen taankleurig of wit zyn; die van den tweeden rang van kleur als de dekvederen; de staart gerond met talryke overdwarssche banden van zwartachtig bruin, en meer of min zuiver wit; de onderkaak, strot en dyen effen taankleurig; de borst en buik van dezelfde kleur met in de lengte daar over verspreide zwarte streken, uitgezonderd aan de zyden alwaar zy overdwars gaan; de pooten, toonen, en washuid geel; de klauwen donker hoornkleur; het grondstuk van de bovenkaak groenachtig blaauw; de top donker hoornkleur; het grondstuk van de onderkaak geelachtig; de punt zwartachtig. De lengte van den vogel is van omtrent vyftien duimen. Hy bewoont Klein Namaqualand

CIRCUS SUPERCILIARIS, (*Mihi*).—Het bovenlyf vuil bruin, met een aantal vedereh roodachtig wit getopt, voornamelyk die van de schouders; de dekvederen van de vleugelen, zoo mede de slagpennen, beide van den eersten en den tweeden rang, bruin, met roodachtig wit getopt; de boven dekvederen van den staart gedeeltelyk wit en gedeeltelyk bruin; de staart gerond en van eene bruine kleur, met twee overdwarsche witte banden kruiswyze over iedere veder omtrent het midden van dezelve, die daarenboven aan het grondstuk en den top wit zyn; het voorhoofd wit, met eene onderscheidene lyn van gelyke kleur zich uitstreckende over ieder oog, en eene andere, ofschoon niet zoo uitgestrekt, beneden den oogkring; de wangen donker bruin, en onmiddelyk daarachter een volmaakte kraag van overeindstaande helder roodachtige witte vederen; het onderlyf taanig wit; de oogen donker bruin; de pooten en toonengeelachtig; de klauwen donker hoornkleur; de washuid geel; de bek byna zwart. De lengte van den vogel is van zestien duimen. Hy bewoont Klein Namaqualand en omstreeks de Olifants-rivier. Waarschynlyk is die door my beschreven, een vogel voor of na de eerste verwisseling van zyne vederen.

ALGEMEENE GELOOFSBELYDENIS DER GANSCHER
PROTESTANTSCHER KERK.

*Een brief van den Predikant COQUEREL, aan den
Heer O. EGGER, te Parys.**

Ik heb u voor eenige maanden, eene korte opgave van het gemeenschappelyk geloof aller Protestantscher Kerken beloofd. Eene verhandeling over deze zoo belangryke en ernstige zaak, verdient aan u met regt te worden opgedragen, daar gy in eenen tyd, waarin het geloof en deszelfs magtige overtuiging weinig invloed op de gemoederen schynen te hebben, door uwe den man van eer zoo eigendommelyke opregtheid, hebt uitgemunt.

* De Hr. O. EGGER, was voorheen een aanzienlyk en kundig Roomsche Geestelyke, die door langdurig en naauwkeurig onderzoek, uit ware overtuiging, van de Roomsche tot de Protestantsche Kerk overging.