

VERÖFFENTLICHUNGEN DES REICHS-KOLONIALAMTS

Nr. 5

# JAGD UND WILDSCHUTZ

IN DEN

# DEUTSCHEN KOLONIEN

HERAUSGEGEBEN VOM

REICHS-KOLONIALAMT

MIT 6 KARTEN

THE LIBRARY OF THE

MAR 7 1932

UNIVERSITY OF ILLINOIS.



9413

JENA

VERLAG VON GUSTAV FISCHER

1918

# I. Jagd und Wildschutz in den afrikanischen Schutzgebieten.

## Vorbemerkung.

Wohl die jagdlich wichtigsten und auch dem Jäger meist am besten bekannten Tiere Afrikas sind die in zahlreichen Arten vorkommenden Antilopen. Sie wurden daher, in Abweichung von den Regeln der zoologischen Systematik bei den folgenden Zusammenstellungen der jagdbaren Tiere an die Spitze gestellt. Dies läßt sich um so mehr rechtfertigen, als die Beschreibung des Wildbestandes unserer Kolonien nicht vom rein zoologischen Standpunkte aus gegeben werden, sondern nach den in der Einleitung kurz skizzierten Gesichtspunkten der Jagd und des Wildschutzes stattfinden sollte. Aus diesem Grunde werden auch im folgenden nur die wichtigeren Wildarten mit ihrem Artnamen aufgeführt, während sich die Aufzählung der weniger wichtigen, aber manchmal in zahlreichen Arten vorkommenden Tiere vorwiegend auf die Familien oder Gattungen erstreckt, und nur deren angesehenste Vertreter als Arten genannt werden. Insbesondere mußte die reichhaltige Vogelwelt der Kürze halber in diesem Sinne behandelt werden.

## A. Deutsch-Ostafrika.

### a) Wildbestand und Ausübung der Jagd.\*)

Die Gliederung der Tierwelt des Schutzgebiets entspricht naturgemäß im wesentlichen den dort herrschenden Vegetationsverhältnissen. Dementsprechend haben wir es in den Waldgebieten mit einer „Waldfauna“, ähnlich derjenigen des Kameruner Waldlandes und in den, ihrer Ausdehnung nach weit überwiegenden, periodisch trockenen Steppen mit einer „Steppenfauna“ zu tun. Letztere aber ist es, die unsere größte und wildreichste Kolonie als einzigartiges und überaus ergiebiges Feld jagdlicher Betätigung in weiten Kreisen bekannt gemacht hat.

\*) Im Verlage der Deutsch-Ostafrikanischen Zeitung G. m. b. H. in Daresalam ist im Jahre 1912 ein „Jagdhandbuch für Deutsch-Ostafrika“ erschienen. Es enthält eine Zusammenstellung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, sowie kurze Winke für die Vorbereitung und Ausführung von Jagdreisen in Deutsch-Ostafrika; auch sind dem Buche verschiedene Tafeln mit Gehörnen beigegeben.

Von den wichtigeren Vertretern der dortigen jagdbaren Tierarten sind folgende zu nennen<sup>1)</sup>:

- Zwergantilope, *Cephalophus (Guevei) lugens* Thos.  
*Cephalophus sundevalli* Fitz.  
*Cephalophus hecki* Mtsch.  
*Cephalophus* der *aequatorialis*-Gruppe.
- Schopfantilope, *Cephalophus natalensis vassei* Tronescart.  
*Cephalophus harveyi* Thos.  
*Cephalophus spadix* True.
- Ducker, *Cephalophus (Sylvicapra) der grimmia*-Gruppe.  
*Cephalophus (Sylvicapra) abyssinica nyansae* Neum.
- Windspiel-Antilope, *Madoqua (Rhynchotragus) thomasi* Neum.
- Moschusböckchen, *Nesotragus moschatus* Van Duben.
- Steinböckchen, *Pediotragus neumanni* Mtsch.  
*Pediotragus neumanni stigmaticus* Lönnberg.
- Zierböckchen, *Calotragus* der *melanotis*-Gruppe.
- Bleichbock oder Oribi, *Ourebia* der *scoparia*- und der *montana*-Gruppe.
- Klippspringer, *Oreotragus aceratos* Noack.  
*Oreotragus schillingsi* Neumann.
- Zwerggazelle *Gazella (Eudorcas) ruwanae* Knottn. Meyer.  
*Gazella (Eudorcas) manyarae* Knottn. Meyer.  
*Gazella (Eudorcas) wembaerensis* Knottn. Meyer.  
*Gazella (Eudorcas) thomsoni* Gthr.  
*Gazella (Eudorcas) mundorosica* Knottn. Meyer.  
*Gazella (Eudorcas) sabakiensis* Knottn. Meyer.  
*Gazella (Eudorcas) ndjiriensis* Knottn. Meyer.  
*Gazella (Eudorcas) schillingsi* Knottn. Meyer.  
*Gazella (Eudorcas) langheldi* Knottn. Meyer.
- Riesengazelle, *Gazella (Matschiea) granti* Brooke.  
*Gazella (Matschiea) robertsi* Thos.
- Sesse- oder Grasantilope, *Adenota* der *vardoni*-Gruppe.
- Riedbock, *Redunca thomasinae* Sclat.
- Swalla oder Schwarzfersenantilope, *Aepyceros suara* Mtsch.
- Situnga, Sumpfböck, *Tragelaphus (Limnotragus) spekei* Sclat.
- Buschbock, *Tragelaphus (Tragelaphus) der roualeyni*-Gruppe.

<sup>1)</sup> Die eingeklammerten Namen bezeichnen die Untergattungen, der erste kleingeschriebene Name die Art, der zweite die Rasse. Nur solche Arten und Rassen sind erwähnt, welche aus den Schutzgebieten oder in nächster Nähe der Grenze genau beschrieben waren; sonst ist nur diejenige Art genannt, welcher die dort vorkommenden Rassen wahrscheinlich am ähnlichsten sind.

- Flußschwein, *Potamochoerus choeropotamus daemonis* Lönnb.  
Flußpferd, *Hippopotamus* der *amphibius*-Gruppe.  
Zebra, *Hippotrigis muansae* Mtsch.  
    *Hippotrigis mariae* Praczak.  
    *Hippotrigis boehmi* Mtsch.  
Nashorn, *Rhinoceros holmwoodi* Sclater.  
Elefant, *Elephas africanus knochenhaueri* Mtsch.  
Baumschliefer, *Procavia (Dendrohyrax) scheelei* Mtsch.  
    *Procavia (Dendrohyrax) stuhlmanni* Mtsch.  
    *Procavia (Dendrohyrax) neumanni* Mtsch.  
    *Procavia (Dendrohyrax) terricola* Mollison.  
    *Procavia (Dendrohyrax) validus* True.  
Klippschliefer, (*Heterohyrax*) der *brucei*-Gruppe.  
    *Procavia (Procavia) matschiei* Neumann.  
Seekuh, *Halicore* der *dugung*-Gruppe.  
Hase, *Lepus* der *ochropus*-Gruppe.  
    *Lepus victoriae* Thos.  
Erdeichhörnchen der Gattung *Xerus* H. E.  
Eichhörnchen der Gattung *Sciurus* L. mit den Untergattungen  
    *Funisciurus*, *Heliosciurus* und *Paraxerus*.  
Flugeichhörnchen der Gattung *Anomalurus* Waterh.  
Springhase der Gattung *Pedetes*.  
Schuppentiere der Gattung *Manis* mit den Untergattungen *Pholidotus*  
    und *Manis*.  
Erdferkel, *Orycteropus wertheri* Mtsch.  
Gefleckte Hyäne, *Hyaena (Crocotta) germinans* Mtsch.  
    *Hyaena (Crocotta) kibonotensis* Lönnb.  
    *Hyaena (Crocotta) panganiensis* Lönnb.  
    *Hyaena (Crocotta) thomasi* Cabrera.  
Streifenhyäne, *Hyaena (Hyaena) schillingsi* Mtsch.  
Zibeth-Hyäne der Gattung *Proteles*.  
Hyänenhund der Gattung *Lycyon*.  
Löffelhund der Gattung *Otocyon*.  
Schakal, *Canis (Lupulella)* der *mesomelas*-Gruppe.  
    *Canis (Schaeffia)* der *adustus*-Gruppe.  
Löwe, *Felis (Leo) sabakiensis* Lönnb.  
    *Felis (Leo) massaicus* Neum.  
Leopard, *Felis (Leopardus) suahelicus* Neum.  
Karakal, *Felis (Caracal)* der *nubica*-Gruppe.  
Serval, *Felis (Zibethailurus)* der *serval*-Gruppe.  
Wildkatze, *Felis (Felis)* der *ocreata*-Gruppe

Aus dem Wildreservat im Bezirk Muanza (Res. Nr. 11) liegen Beobachtungen über die Bewegungen des Wildstandes noch nicht vor. Eine besondere Aufsicht über dieses Reservat ist nicht erforderlich und besteht daher auch nicht.

Im Wildreservat des Bezirks Lindi (Res. Nr. 12) am oberen Mbemkuru, hat sich der Wildstand im allgemeinen beträchtlich gehoben. Besonders hervorzuheben ist, daß trüchtige Elefantenkühe sich mit Vorliebe dorthin zurückziehen. Die in der Natur leicht kenntlichen Grenzen des Wildreservats werden zurzeit von zwei Wildwärtern und hier und da von Askari-Patrouillen abgeschritten. Übertretungen wurden bisher nicht gemeldet, so daß die gegenwärtige Aufsicht einstweilen zu genügen scheint.

Das Wildreservat des Bezirks Udjidji (Res. Br. 13) besteht erst seit kurzem, so daß ein Einfluß auf den Wildstand noch nicht sichtbar sein kann. Die Aufsicht über dieses Reservat wird zurzeit durch einen eingeborenen Wildwärter geübt.

## B. Kamerun.

### a) Wildbestand und Ausübung der Jagd.

Die im Schutzgebiet Kamerun vorkommenden Arten des jagdbaren Wildes sind:

- Blaurücken-Schopfantilope, *Cephalophus (Cephalophus) der rufilatus-*Gruppe.
- Schwarzstirn-Schopfantilope, *Cephalophus (Cephalophus) der nigri-*  
*frons-*Gruppe.
- Schwarzbinden-Schopfantilope, *Cephalophus (Cephalophia) der ogilby-*  
*Gruppe.*
- Weißbauch-Schopfantilope, *Cephalophus (Cephalophia) der Ceuco-*  
*gaster-*Gruppe.
- Schwarzsteiß-Schopfantilope, *Cephalophus (Cephalophella) der calli-*  
*pygus-*Gruppe.
- Rotbauch-Schopfantilope, *Cephalophus (Cephalophops) dorsalis ca-*  
*staneus* Thos.
- Schwarze Schopfantilope, *Cephalophus (Cephalophidium) der pluto-*  
*Gruppe.*
- Weißrücken-Schopfantilope, *Cephalophus (Terpone) der sylvicultrix-*  
*Gruppe.*

- Kleine Zwergantilope, *Cephalophus (Guevei) melanorheus* Cray.  
Große Zwergantilope, *Cephalophus (Philantomba)* der *maxwelli*-Gruppe.  
Zwergböckchen, *Hylarnus batesi* Thos.  
Ducker, *Sylvicapra* der *coronata*-Gruppe.  
Klippspringer, *Oreotragus saltator porteusi* Lyd.  
Bleichböckchen, Oribi, *Ourebia* der *hastata*-Gruppe.  
Gazelle, *Gacella (Eudorcas)* der *rufifrons*-Gruppe.  
Urwald-Buschbock, *Tragelaphus knutsoni* Lönnb.  
Steppen-Buschbock, *Tragelaphus* der *scriptus*-Gruppe.  
Sumpfantilope, *Limnotragus* der *gratus*-Gruppe.  
Riedbock, *Redunca* der *redunca*-Gruppe.  
Gras-Antilope, *Adensta pousarguesi* Neum.  
Leier-Antilope, *Damaliscus korrigum* Ogilb.  
Wasserbock, *Kobus* der *unctuosa*-Gruppe.  
Streifen-Antilope, *Boocerus* der *euryceros*-Gruppe.  
Elen-Antilope, *Taurotragus* der *derbyanus*-Gruppe.  
Kuh-Antilope, *Bubalis* der *major*-Gruppe.  
Pferde-Antilope, *Hippotragus* der *Koba*-Gruppe.  
Kudu-Antilope, (*Strepsiceros* ?).  
Urwald-Büffel, *Bubalus* der *reclinis*-Gruppe.  
Steppen-Büffel, *Bubalus-brachyceros* Gray.  
Hirschferkel, Wassermoschustier, *Dorcatherium aquaticum batesi* Lyd.  
Giraffe, *Giraffa* der *peralta*-Gruppe.  
Flußpferd, *Hippopotamus* der *senegalensis*-Gruppe.  
Nashorn, *Rhinoceros* der *bicornis*-Gruppe.  
Elefant, *Elephas africanus cyclotis* Mtsch. von Yaunde und  
*Elephas africanus rothschildi* Lyd. vom Süden des Tschad-Sees.  
Klippschliefer, *Procavia* in verschiedenen Arten.  
Baumschliefer, *Dendrophyrax dorsalis* Fras.  
Pinseloherschwein, *Potamochoerus* der *porcus*-Gruppe.  
Waldschwein, *Hylochoerus rimator* Thos.  
Warzenschwein, *Phacochoerus* der *aeliani*-Gruppe.  
Seekuh, *Lamantin, Manatus vogeli* Owen im Tschad-See, *oweni Deuchailu* in Südkamerun.  
Stachelschwein, *Hystrix* der *senegalensis*-Gruppe.  
Quastenstachelschwein, *Atherura* der *centralis*-Gruppe.  
Hase, *Lepus chadensis* Thos. und Wroughton.  
Borstferkel, *Thryonomys* der *swinderenianus*-Gruppe.  
Erdferkel, *Orycteropus leptodon* Hirst.  
Erdschuppentier, *Manis (Manis)* der *gigantea*-Gruppe.

dieses Gebiets liegen einige wenige Eingeborenendörfer; im Inneren ist es völlig unbewohnt, mit unberührtem Urwald bestanden, sowie mit vielen sumpfigen Stellen und kleinen Wasserläufen versehen. Das Reservat ist ein Paradies für Elefanten und das übrige, im Bezirk Edea vorkommende Wild. Außer gelegentlichen Bereisungen findet eine besondere Aufsicht über das Reservat nicht statt. Da es sich aber bei Jagdüberrretungen vornehmlich um den Elefanten handelt, so ist damit zu rechnen, daß jeder Fall des Wilderns der Behörde bekannt wird. Solche Fälle sind im Schongebiet selbst bisher nur sehr vereinzelt vorgekommen, öfters aber an den Stellen, wo die Grenzen zweifelhaft sind.“

Die Bildung von weiteren Wildreservaten im Schutzgebiet ist für die nächste Zeit geplant.

### C. Südwestafrika.

#### a) Wildbestand und Ausübung der Jagd.

Unter den jagdbaren Tieren von Deutsch-Südwestafrika haben entsprechend dem hauptsächlich der Steppenformation angehörenden Vegetationscharakter des Landes die zumeist in Herden lebenden Steppentiere, vor allem die verschiedenen Antilopenarten die führende Rolle inne. Während z. B. in weiten Gebieten Kameruns Tierformen des Waldes vorherrschen, fehlen solche in Südwestafrika fast ganz; namentlich sind die Affenarten in geringer Zahl vorhanden. Sehr mannigfaltig dagegen ist die Vogelwelt. Nachstehende Liste gibt die wichtigsten Arten der jagdbaren Tierwelt Deutsch-Südwestafrikas:

Zwergantilope, Blauböckchen, Kleenebock, *Cephalophus (Guevei) anchietae* Boc.

Weißbrückenschopfantilope, *Cephalophus (Terpone)* der *sylvicultrix*-Gruppe.

Ducker, Duiker, *Sylvicapra* der *grimmia*-Gruppe.

Klippspringer, Klippbock, *Oreotragus* der *oreotragus*-Gruppe.

Bleichbock, *Oribi*, *Ourebia* der *scoparia*-Gruppe.

Zierböckchen, Steenbock, Vlaktebock, *Pediotragus kelleni* Jent.

Tapirböckchen, *Madoqua damarensis* Gthr.

Springbock, *Antidorcas euchoe* Zimm.

Grasantilope, Poku, *Adenota* der *vardoni*-Gruppe.

Rooi-Riedbock, *Cervicapra* der *fulvorufula*-Gruppe.

Schwarzfersenantilope, Pallah, Rooibock, *Aepyceros petersi* Boc.

Gemsbock, Spießbock, Oryxantilope, *Oryx gazella* L.

Buschbock, Boschbock, *Tragelaphus ornatus* Pocock.

- Sumpfbock, Waterkudu, *Limnotragus selousi* Rothsch.  
Wasserbock, *Cobus penricei* Rothsch.  
Lidschwiantilope, *Onotragus leche* Gray.  
Kuhantilope, Hartebeest, *Bubalis* der *caama*-Gruppe und der *lichtensteini*-Gruppe.  
Mondantilope, Bastard-Hartebeest, *Damaliscus* der *lunata*-Gruppe.  
Pferdeantilope, Roan, Bastard-Gemsbock, Bastard-Eland, *Hippotragus* der *equinus*-Gruppe.  
Rappenantilope, Sablebock, Zwart-witgens, *Hippotragus* der *niger*-Gruppe.  
Kuduantilope, Kudu, *Strepsiceros* der *strepsiceros*-Gruppe.  
Elenantilope, Eland, *Taurotragus kaufmanni* Mtsch.  
Gnu, Bastard-Wildebeest, *Connochaetes* der *taurinus*-Gruppe.  
Wüstengazelle, Rehbock, *Pelea villosa* Burch.  
Büffel, *Bubalus* der *caffer*-Gruppe.  
Giraffe, *Giraffa angolensis* Lyd.  
Zebra, *Equus (Hippotrigis) zebra hartmannae* Mtsch.  
„ *Equus (Hippotrigis) chapmanni* Layard.  
„ Quagga, *Equus (Hippotrigis)* der *antiquorum*-Gruppe.  
Elefant, *Elephas* sp. noch nicht untersucht.  
Nashorn, *Rhinoceros* sp. noch nicht untersucht.  
Flußpferd, *Hippopotamus* der *amphibius*-Gruppe.  
Klippdachs, *Procavia capensis* Pall.  
Flußschwein, *Potamochoerus* der *larvatus*-Gruppe.  
Warzenschwein, *Phacochoerus* der *aethiopicus*-Gruppe.  
Hase, *Lepus ansorgei* Thos.  
    *Lepus Salae* Jent.  
    *Lepus capensis granti* Thos. et Schwann.  
    *Lepus ochropus kalaharicus* Dollm.  
    *Lepus saxatilis megalotis* Thos. et Schwann.  
    *Lepus (Pronolagus) crassicaudatus curryi* Thos. Boshof.  
Erdeichhörnchen, *Xerus capensis* Kerr.  
Erdferkel, *Orycteropus afer* Pall.  
Stachelschwein, *Hystrix africae-australis* Pet.  
Schuppentier, *Manis temmincki* Smuts.  
Seekuh, *Lamantin, Manatus*.  
Wale, *Cetacea*.  
Bärenpavian, *Papio porcarius* Bodd. in mehreren Rassen.  
Meerkatze, *Cercopithecus* der *cynosurus*-Gruppe.  
Löwe, *Felis (Leo) leo capensis* Fisch.  
Leopard, *Felis (Leopardus)* der *pardus*-Gruppe.