

Noctule a ses os du nez postérieurement, ses frontaux, ses pariétaux et son occipital sur une même ligne droite oblique; que l'arcade zygomatique est horizontale, et que par là les os de l'oreille se trouvent au niveau de sa partie antérieure; que le maxillaire supérieur a une grande hauteur, et que celle de la branche montante de la mâchoire inférieure l'est d'autant moins que la cavité glénoïde ne s'est pas plus relevée que l'arcade zygomatique.

Le Kirouvoula (*Vespertilio pictus*) est celui des Vespertillions qui se rapproche le plus de la Furie par la disposition des diverses parties de sa tête; toutefois, la différence est encore grande. L'espèce est désignée par l'auteur sous le nom de *Furia horrens*; sa longueur, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est d'un pouce et demi, et son envergure est de six pouces; sa couleur est d'un beau noir uniforme, et M. Cuvier en doit la possession à M. Leschenault, qui la découvrit à la Mana, dans son premier voyage en Amérique.

292. DESCRIPTION DE DEUX QUADRUPÈDES DU SUD DE L'AFRIQUE; par M. AND. SMITH. (*Transact. of the Linnean Society of London*; Vol. XV, 2^e part., page 460, 1827).

Hycæna villosa Smith.

D'un gris-brun foncé, mêlé de grandes taches noires ou de bandes obliques; le cou jaunâtre; les extrémités rayées de lignes noires.

C'est cette espèce que les colons du Cap désignent sous le nom de *Strand Wolf* (Loup de rivage). On connaît donc maintenant deux espèces d'hyènes qui appartiennent à cette contrée, savoir: l'hyène tachetée et cette dernière; mais celle-ci, que M. Smith donne comme nouvelle, a déjà été décrite par Thunberg, sous le nom d'*Hycæna brunnea*. (*Mémoire de l'Acad. de Stockh.*; 1820, 1^{re} partie). — Une belle figure accompagne le texte du zoologiste anglais.

Le second animal que l'auteur décrit, appartient au genre *Hyrax* (Daman); il lui donne le nom spécifique d'*arboreus*, parce qu'il habite constamment des creux d'arbres.

Hyrax arboreus Smith. (*Boom-Das*, Blaireau des arbres, selon les Indigènes.)

Le dessus d'un brun rougeâtre entremêlé de noir; le dessous blanc; une tache blanche près du milieu du dos.

Cette espèce, qui est plus grande que l'*H. capensis*, a environ 21 pouces depuis le nez jusqu'à l'extrémité du dos, et à-peu-près 7 pouces de hauteur; du reste, elle ressemble à cette dernière par sa forme générale, par l'absence de la queue, par ses mouvemens, etc. — Cette espèce n'est point figurée.

293. NOTICE SUR UN NOUVEAU GENRE DE MAMMIFÈRES découvert à Sumatra par sir Stamford RAFFLES; description publiée par MM. HORSFIELD et VIGORS. Avec 1 fig. (*Zoologic. journal*; n° X, avril-sept. 1827, p. 246).

Feu M. Raffles avait inséré dans le 13^e volume des Transactions de la Société Linnéenne, une notice sur l'animal dont il s'agit, et qu'il avait simplement rapporté à un genre de Linné avec le nom spécifique de *gymnura*. MM. Horsfield et Vigors ayant reçu deux individus de la même espèce, dont l'un était très-bien conservé, ont pu figurer l'animal et en donner une description complète. Ils lui ont reconnu des caractères distinctifs suffisans pour en faire un genre particulier, et ils désignent ce nouveau genre par le nom spécifique de Raffles.

Genus GYMNURA.

Incisores supra 2, remoti, maximi, subcylindrici, apice rotundato; infra 6, quatuor intermedii approximati, breviusculi, proclives, compressi, paginâ anteriori convexâ, interiori planâ, scalpro rotundato, duo laterales abbreviati, acuti. Laniarii supra utrinsecus 2, ab incisoribus remoti illisque breviores, conici, antici majores; infra utrinsecus 1, maximus, conicus, subarcuatus, introrsum spectans. Molares supra utrinsecus 8, à laniariis remoti; tres antici unicuspidés, primus elongatus sectorius, secundus et tertius abbreviati; quartus cuspide conicâ elongatâ, ad basin gradu postico et exteriori abbreviato; quintus cuspide exteriori longissimâ interiori abbreviatâ; sextus et septimus maximi, multicuspidés, cuspidibus subabbreviatis rotundatis; octavus minor subtritorius, cuspidibus obtusioribus: infra septem, tres antici unicuspidés, compressi, primus et secundus breviores, tertius subelongatus, quartus cuspide elongatâ, gradu anteriori alteroque posteriori abbreviatis, quintus, sextus et septimus maximi, multicuspidés, cuspidibus elatioribus, acutioribus.

Caput elongatum acuminatum, angustatum, lateribus compressum, supra planiusculum. Rostrum obtusum, elongatum,