

MANUALE  
DI  
STORIA NATURALE

DI  
GIO. FEDERICO BLUMENBACH

PROFESSORE NELL' UNIVERSITÀ DI GOTTINGA.

*PRIMA VERSIONE ITALIANA*

FATTA SULL' ULTIMA EDIZIONE ORIGINALE

CORREDATA DA NOTE DEL TRADUTTORE.

*Multa fiunt eadem, sed aliter.*

QUINTILIANO.

---

*VOLUME PRIMO.*

---



LUGANO  
DAI TIPI DI GIUS. VANELLI E COMP.  
1825.

Testa quasi rotonda; fronte convessa; orecchie amplissime ritondate; corona dei denti molari marchiata in rombo. *Op. cit.* tav. 19. fig. C.

Questa specie che abita il centro ed il sud d' Africa, presentemente viene addomesticata tutt' al più nell' interno di quella parte della terra; gli si dà la caccia soltanto per approfittare della carne e dell' avorio.

### G. XLI. Rinoceronte. *Rhinoceros* (*Abada*). Rhinocéros. Nashorn.

*Corno solido, conico, impiantato sul naso.*

1. Rinoceronte d' Asia. *R. Asiaticus*. Le Rhinocéros d' Asie. Der asiatik Nashorn.

Quattro incisivi nelle due mandibole, gli inferiori conici, i superiori semilobati; mancano i canini. *Op. cit.* tav. 7. fig. B.

Delle Indie orientali. Il corno comunemente unico che distingue questa specie, non è aderente all' osso come avviene nell' Africano a due corna; ma è attaccato alla pelle.

2. Rinoceronte Africano. *R. Africanus*. Le Rhinocéros d' Afrique. Der africanische Nashorn.

Mancano tanto gli incisivi, quanto i canini. *Opera cit.* tav. 7. fig. A.

Per lo più ha 2 corni, quello di dietro è più piccolo dell' anteriore. Abita nel sud dell' Africa, ed al Capo.

### G. XLII. Ippopotamo. *Hippopotamus*. Hippopotame.

*Incisivi superiori allontanati, inferiori procumbenti; canini inferiori curvati in dentro, troncati obliquamente.*